

- **Informieren Sie sofort Ihren Arzt**, wenn Sie glauben, dass Ihre MS sich verschlechtert (z. B. Schwäche oder Sehveränderungen), oder bei Ihnen nach dem Absetzen von GILENYA® aufgrund einer Schwangerschaft neue Symptome auftreten.
- Nach dem Absetzen von GILENYA® müssen Sie noch 2 Monate lang wirksam verhüten, da es so lange dauert, bis der Körper GILENYA® ausgeschieden hat.



GILENYA® kann bei Anwendung während der Schwangerschaft Ihr ungeborenes Kind schädigen.

Schwangere und gebärfähige Frauen, die nicht wirksam verhüten, dürfen GILENYA® (Fingolimod) nicht einnehmen.

Es ist wichtig, dass Sie während der Einnahme von GILENYA® und für 2 Monate nach dem Absetzen zur Vermeidung einer Schwangerschaft wirksam verhüten. Ihr Arzt wird Sie hinsichtlich einer wirksamen Empfängnisverhütung beraten.

- Bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage, die ausführliche Informationen über die ordnungsgemäße Anwendung von GILENYA® enthält.
- Wenn Sie Fragen zu diesen Informationen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.
- Für weitere Informationen zu MS oder GILENYA® besuchen Sie <https://www.novartis.com/at-de/em/gilenya>

Novartis Pharma GmbH

Jakov-Lind-Straße 5/Top 3.05, 1020 Wien

GILENYA® Patientenkarte v1.0

Genehmigung 05/2025

Erstellungsdatum 04/2025 | FA-11409315



Patientenkarte zur
sicheren Anwendung –
GILENYA® (Fingolimod)

**Bitte lesen Sie auch die
Gebrauchsinformation zu
GILENYA® aufmerksam
durch.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Karte ausschließlich die männliche Form verwendet, entsprechende Begriffe beziehen sich aber auf Personen jeden Geschlechts.

Vor der Behandlung mit GILENYA®

- GILENYA® ist teratogen. Es handelt sich also um ein Medikament, das bei Einnahme während der Schwangerschaft das Ungeborene schädigt oder sich negativ auf dessen Entwicklung auswirkt, was zu Geburtsfehlern oder Fehlbildungen führt.
- Ihr Arzt wird Sie zu Beginn Ihrer Behandlung über das teratogene Risiko und die erforderlichen Maßnahmen zur Minimierung dieses Risikos informieren, und Sie während der Behandlung immer wieder daran erinnern.
- Vor der Einleitung der Behandlung muss ein Schwangerschaftstest durchgeführt werden, und der Arzt muss sich von dessen negativem Ergebnis überzeugen.

- Ihr Arzt wird Sie darüber informieren, dass Sie während der Behandlung und für 2 Monate nach Absetzen des Medikaments wirksam verhüten müssen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über wirksame Verhütungsmöglichkeiten, die für Sie verfügbar sind.
- Bitte lesen Sie auch den Patientenleitfaden für GILENYA®, den Sie von Ihrem Arzt erhalten.

Während Sie GILENYA® einnehmen

- Frauen dürfen während der Behandlung mit GILENYA® und für 2 Monate nach dessen Absetzen nicht schwanger werden.
 - Frauen müssen während der Einnahme von GILENYA® und für 2 Monate nach dem Absetzen der Behandlung wirksam verhüten.
 - Schwangerschaftstests müssen in geeigneten Abständen wiederholt werden.
 - Ihr Arzt wird regelmäßig mit Ihnen über die Risiken von GILENYA® im Hinblick auf die Schädigung eines ungeborenen Kindes bei einer eintretenden Schwangerschaft und die erforderlichen Maßnahmen zur Minimierung dieses Risikos sprechen.
- Wenn Sie schwanger werden bzw. schwanger werden möchten, **muss** die Behandlung mit GILENYA® **abgebrochen werden**.
 - Informieren Sie **sofort** Ihren Arzt, wenn Sie glauben, dass Sie schwanger sind. Ihr Arzt wird Ihnen im Falle einer Schwangerschaft und bei der Beurteilung des potenziellen Ausgangs einer Schwangerschaft beratend zur Seite stehen.