

Nach Absetzen von MAYZENT®

- Bitte nutzen Sie eine effektive Verhütungsmethode bis zumindest 10 Tage nach Absetzen der Therapie mit MAYZENT®.
- Falls Sie während der Behandlung mit MAYZENT® schwanger geworden sind, wird Ihr Arzt Sie über das Risiko für das ungeborene Kind beraten und die Auswirkungen auf die Schwangerschaft einschätzen.

Kontaktdetails zu Ihrem Arzt

- Bitte informieren Sie umgehend Ihren Arzt, falls Sie nach Beendigung der Behandlung mit MAYZENT® eine **Rückkehr der Krankheitsaktivität der Multiplen Sklerose** bei sich bemerken.

Stempel

Weitere Informationen und Fragen

- Bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage, die ausführliche Informationen über die ordnungsgemäße Anwendung von MAYZENT® enthält.
- Wenn Sie Fragen zu diesen Informationen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.
- Für weitere Informationen zu MAYZENT® besuchen Sie <https://www.novartis.com/at-de/em/mayzent>

Novartis Pharma GmbH
Jakov-Lind-Straße 5/Top 3.05, 1020 Wien

MAYZENT® Patientenkarte v1.0 Genehmigung 01/2026
Datum der Erstellung 10/2025 | FA-11549862

 NOVARTIS



Patientenkarte zur
sicheren Anwendung –
MAYZENT® (Fingolimod)

**Bitte lesen Sie auch die
Gebrauchsinformation zu
MAYZENT® aufmerksam
durch.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Karte ausschließlich die männliche Form verwendet, entsprechende Begriffe beziehen sich aber auf Personen jeden Geschlechts.

Inhalt

- **BEI THERAPIEBEGINN
MIT MAYZENT®**

- **WÄHREND DER BEHANDLUNG
MIT MAYZENT®**

- **NACH ABSETZEN VON MAYZENT®**

- **KONTAKTDETAILS ZU IHREM ARZT**



Bei Therapiebeginn mit MAYZENT®

- **MAYZENT® darf von schwangeren Frauen sowie Frauen im gebärfähigen Alter, die keine zuverlässige Verhütungsmethode anwenden, nicht eingenommen werden.**
- Vor Beginn der Behandlung muss ein **durch den Arzt überprüfter, negativer Schwangerschaftstest** vorliegen.
- Schwangerschaftstests müssen in regelmäßigen Abständen während der Behandlung wiederholt werden.
- Sprechen Sie mit Ihrem Frauenarzt über **zuverlässige Verhütungsmethoden** und legen Sie gemeinsam eine geeignete Methode fest.
- Bitte beachten Sie ebenfalls den Leitfaden für Patienten und die Gebrauchsinformation zu MAYZENT®.

Während der Behandlung

- Sie dürfen während der Behandlung mit MAYZENT® nicht schwanger werden.
- Verwenden Sie eine effektive Verhütungsmethode während der Behandlung inklusive zumindest 10 Tage nach Behandlungsende.
- Wenn sie eine Schwangerschaft planen, besprechen sie das Absetzen der Therapie mit ihrem behandelnden Arzt. Ihr Arzt wird mit Ihnen über mögliche Risiken der MAYZENT®-Therapie auf den Fötus als auch über die Möglichkeit einer erneuten Krankheitsaktivität sprechen.
- Informieren Sie sofort Ihren Arzt, falls Sie während der Behandlung mit MAYZENT® trotzdem schwanger werden oder vermuten schwanger zu sein. Ihr Arzt muss die Behandlung mit MAYZENT® dann umgehend abbrechen.
- In diesem Fall werden bei Ihnen weitere medizinische Untersuchungen (z. B. Ultraschall-Untersuchung) durchgeführt.
- Sollten Sie doch während der Therapie mit MAYZENT® schwanger werden, melden Sie diese umgehend Ihrem Arzt oder direkt an Novartis.