

Psoriasis-Arthritis: Kriterien & Hilfsmittel für die Diagnose
Image



Psoriasis-Arthritis: Kriterien & Hilfsmittel für die Diagnose

Für die Identifizierung von Patienten mit erhöhtem Risiko, eine Psoriasis-Arthritis zu entwickeln, und deren Diagnose stehen verschiedene Instrumente zur Verfügung. Die gebräuchlichsten sind:

- CASPAR-Kriterien¹
- GEPARD-Fragebogen²
- PEST-Fragebogen³

CASPAR-Kriterien

CASPAR = Classification Criteria for Psoriatic Arthritis

Die CASPAR-Kriterien ermöglichen mit einer 98,7 % igen Spezifität und einer 91,4 % igen Sensitivität eine diagnostische Aussage über das Vorliegen einer Psoriasis-Arthritis.¹

Die Klassifikationskriterien der PsA sind erfüllt: bei Vorliegen einer entzündlichen Gelenkerkrankung und einem zusätzlichen Score von ≥ 3 .

CASPAR-Klassifikation der Psoriasis-Arthritis¹

Image

DOMÄNE		PUNKTE
1	NACHWEIS EINER PSORIASIS	
	Bestehende Psoriasis _____	2
	Anamnestisch bekannte Psoriasis _____	1
	Positive Familienanamnese für Psoriasis _____ (erst- oder zweitgradige Verwandtschaft)	1
2	PSORIATISCHE NAGELBETEILIGUNG	
	Tüpfelung, Onycholyse, Hyperkeratose _____	1
3	NEGATIVER RHEUMAFAKTOR	
	_____	1
4	DAKTYLITIS	
	Bestehende Daktylitis (Finger oder Zeh) _____	1
	Anamnestische Daktylitis _____	1
5	RADIOLOGISCHE ZEICHEN EINER GELENKNAHEN KNOCHENNEUBILDUNG	
	_____	1

GEPARD-Fragebogen

GEPARD = GERman Psoriasis Arthritis Diagnostic questionnaire

Der GEPARD-Fragebogen ist ein einfaches Instrument für die Früherkennung von Psoriasis-Arthritis bei Patienten mit **Psoriasis**.²

Wenn Patienten mindestens 4 von 13 Fragen mit ja beantworten, liegt mit einer grosser Wahrscheinlichkeit mit einer Sensitivität von 89 % (95 %-Konfidenzintervall 76,5 - 95,2 %) und Spezifität von 69,1 % (95 %-Konfidenzintervall 56,0 - 79,7 %) bei einem Psoriasis-Patienten auch eine Psoriasis-Arthritis vor.²

GEPARD-Fragebogen (Auszug) zur Früherkennung der Psoriasis-Arthritis²

Image

Bitte kreuzen Sie entweder „JA“ oder „Nein“ an

	JA	NEIN
1. Haben Sie schon einmal Gelenkschmerzen gehabt, die mit einer Schwellung eines Gelenkes einhergingen?		
2. War bei Ihnen schon einmal ein ganzer Finger oder Zeh dick?		
3. Haben Sie schon einmal <i>Gelenkschmerzen</i> gehabt, die mit einer <i>Rötung</i> eines Gelenkes einhergingen?		
4. A Fühlten sich schon mal Ihre <i>Gelenke nach dem Aufwachen morgens steif</i> an?		
B Wenn ja, <i>wie lange hielt / hält diese Steifigkeit an?</i>		
5. Haben Sie schon einmal daran gedacht dass Sie an einer Gelenkerkrankung leiden könnten?		
6. Haben Sie schon einmal einen Arzt wegen <i>Gelenkbeschwerden</i> kontaktiert?		

Hier gelangen Sie direkt zu dem Fragebogen:

[Zum GEPARD Fragebogen](#)


PEST-Fragebogen

PEST = Psoriasis Epidemiology Screening Tool

Der PEST-Fragebogen ist für den Einsatz bei Patienten mit Psoriasis entwickelt worden, um eine Früherkennung von Psoriasis-Arthritis Patienten zu ermöglichen. Sensitivität wird mit 92 %, die Spezifität mit 78 % angegeben. Der [Fragebogen](#) umfasst 18 Fragen sowie eine Zeichnung, in der betroffenen Gelenke mit Beschwerden angekreuzt werden können.³

PEST-Fragebogen³

Image



Grafik adaptiert nach Ibrahim GH et al. [Referenz 3]

Hier gelangen Sie direkt zu dem Fragebogen:

[Zum PEST-Fragebogen](#)

Referenzen

1. Taylor W *et al.* Classification criteria for psoriatic arthritis: development of new criteria from a large international study. *Arthritis Rheum.* 2006;54(8):2665-73. doi: 10.1002/art.21972.
2. Härle P *et al.* GEPARD-Patientenfragebogen. *Z Rheumatol* 2010;69(2):157-60, 162-3.doi: 10.1007/s00393-009-0462-2.
3. Ibrahim GH *et al.* PS. Evaluation of an existing screening tool for psoriatic arthritis in people with psoriasis and the development of a new instrument: the Psoriasis Epidemiology Screening Tool (PEST) questionnaire. *Clin Exp Rheumatol.* 2009;27(3):469-74. PMID: 19604440.

Novartis stellt die aufgeführten Referenzen auf Anfrage zur Verfügung.

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/ch-de/therapiegebiete/rheumatologie/heterogene-manifestati>

onen-der-psoriasis-arthritis/psoriasis