



Arthrite psoriasique : critères et outils de diagnostic

On dispose d'instruments différents pour reconnaître et diagnostiquer les patients présentant un risque accru de développer une arthrite psoriasique. Les plus couramment utilisés sont les suivants :

- Critères CASPAR ¹
- Questionnaire GEPARD ²
- Questionnaire PEST ³

Critères CASPAR

CASPAR = Classification Criteria for Psoriatic Arthritis

Les critères CASPAR permettent de diagnostiquer l'existence d'une arthrite psoriasique avec une spécificité de 98,7 % et une sensibilité de 91,4 %. ¹

Les critères de classification de l'APs sont remplis : en présence d'une maladie articulaire inflammatoire et d'un score supplémentaire de ≥ 3 .

Critères CASPAR : classification de l'arthrite psoriasique¹

Image

DOMAINE		POINTS
1	MISE EN ÉVIDENCE D'UN PSORIASIS	
	Psoriasis existant _____	2
	Antécédents connus de psoriasis _____	1
	Antécédents familiaux de psoriasis _____ (au 1 ^{er} ou 2 ^e degré de parenté)	1
2	ATTEINTE UNGUÉALE PSORIASIQUE	
	Ongles ponctués, onycholyse, hyperkératose _____	1
3	NÉGATIVITÉ DU FACTEUR RHUMATOÏDE	
	_____	1
4	DACTYLITE	
	Dactylite existante (doigt ou orteil) _____	1
	Antécédents de dactylite _____	1
5	SIGNES RADIOLOGIQUES D'UNE OSSIFICATION JUXTA-ARTICULAIRE	
	_____	1

1. Taylor W et al. Arthritis Rheum. 2006;54:2665-2673.

Questionnaire GEPARD

GEPARD = GERman Psoriasis-ARthritis Diagnostic questionnaire

Le questionnaire GEPARD est un instrument simple pour la détection précoce de l'arthrite psoriasique chez les patients atteints de **Psoriasis**.²

Si un patient atteint de psoriasis répond par « oui » à au moins 4 questions sur les 13, il est très probable qu'il souffre également d'arthrite psoriasique (sensibilité de 89 % [intervalle de confiance à 95 %, 76,5 - 95,2 %] et spécificité de 69,1 % [intervalle de confiance à 95 %, 56,0 - 79,7 %]).

Questionnaire GEPARD (extrait) pour le diagnostic précoce de l'arthrite psoriasique²

Image

Veuillez cocher « OUI » ou « NON »	OUI	NON
1. Avez-vous déjà eu des douleurs articulaires associées au gonflement d'une articulation ?		
2. Avez-vous déjà eu un doigt ou un orteil complètement enflé ?		
3. Avez-vous déjà eu des <i>douleurs articulaires</i> associées à une rougeur de l'articulation ?		
4. A Avez-vous déjà ressenti <i>une raideur des articulations le matin au réveil</i> ? B Dans un tel cas, <i>combien de temps cette raideur a-t-elle duré</i> ?		
5. Avez-vous déjà pensé être atteint d'une maladie articulaire ?		
6. Avez-vous déjà contacté un médecin en raison de <i>troubles articulaires</i> ?		

Cliquez ici pour accéder au questionnaire :

[Vers le questionnaire GEPARD](#)

Questionnaire PEST

PEST = Psoriasis Epidemiology Screening Tool

Le questionnaire PEST a été mis au point afin de permettre la détection précoce de l'arthrite psoriasique chez les patients psoriasiques. Sa sensibilité est de 97 % et sa spécificité, de 79 %. Ce questionnaire regroupe 18 questions, ainsi qu'un schéma, sur lequel on peut cocher les articulations présentant des symptômes.³

Questionnaire PEST³

Image




Illustration adaptée d'après Ibrahim GH et al.³

Cliquez ici pour accéder au questionnaire :

[Vers le questionnaire PEST](#)

Références :

1. Taylor W *et al.* Classification criteria for psoriatic arthritis: development of new criteria from a large international study. *Arthritis Rheum.* 2006;54(8):2665-73. doi: 10.1002/art.21972.
2. Härle P *et al.* GEPARD-Patientenfragebogen. *Z Rheumatol* 2010;69(2):157-60, 162-3. doi: 10.1007/s00393-009-0462-2.
3. Ibrahim GH *et al.* PS. Evaluation of an existing screening tool for psoriatic arthritis in people with psoriasis and the development of a new instrument: the Psoriasis Epidemiology Screening Tool (PEST) questionnaire. *Clin Exp Rheumatol.* 2009;27(3):469-74. PMID: 19604440.

Novartis fournit les références listées sur demande.

Source URL:

https://www.pro.novartis.com/ch-fr/therapiegebiete/rheumatologie/charge_de_morbidite/classification