Hämatologie-Indikationen
Image



Hämatologie-Indikationen

Akute myeloidische Leukämie (AML)

Akute myeloidische Leukämie (AML)

Die akute myeloische Leukämie (AML) ist die häufigste akute Leukämie bei Erwachsenen.

See more details

Hide details

Chronische Myeloische Leukämie (CML)

Chronische Myeloische Leukämie (CML)

Die Abkürzung CML steht für chronische myeloische Leukämie. Bei einer Leukämie kommt es allgemein zu einer zu erhöhten Anzahl weisser Blutkörperchen.

See more details

Hide details

Myelodysplastisches Syndrom

Myelodysplastisches Syndrom

Myelodysplastische Syndrome (MDS) bilden eine heterogene Gruppe von klonalen Erkrankungen der hämatopoetischen Stammzellen, die durch Zytopenien sowie Dysplasien von Blut- und Knochenma...

See more details

Hide details

Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH)

Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH)

Die paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) ist eine seltene erworbene klonale, nicht-maligne Erkrankung der hämatopoetischen Stammzellen.

See more details

Hide details

Polycythaemia vera

Polycythaemia vera

Die Polycythaemia vera (PV) gehört zu den Myeloproliferativen Neoplasien (MPN).

See more details

Hide details

Source URL: *https://www.pro.novartis.com/ch-fr/node/726*