


	Stade anatomique	T (taille de la tumeur)	N (nombre de ganglions lymphatiques atteints)	
Stade précoce	I A	T1 (≤ 2 cm)	N0 (0)	
	I B	T0 (pas d'indication de tumeur primaire) T1 (≤ 2 cm)	N1mi (micrométastases) N1mi (micrométastases)	
	II A	T0 (pas d'indication de tumeur primaire) T1 (≤ 2 cm)	N1 (1–3) N1 (1–3)	
		T2 ($> 2 - \leq 5$ cm)	N0 (0)	
	II B	T2 ($> 2 - \leq 5$ cm) T3 (> 5 cm)	N1 (1–3) N0 (0)	
Localement avancé	III A	T0 (pas d'indication de tumeur primaire)	N2 (4–9) ou ganglions lymphatiques en dessous du sternum	
		T1 (≤ 2 cm)	N2 (4–9) ou ganglions lymphatiques en dessous du sternum	
		T2 ($> 2 - \leq 5$ cm)	N2 (4–9) ou ganglions lymphatiques en dessous du sternum	
		T3 (> 5 cm)	N1 (1–3), N2 (4–9) ou ganglions lymphatiques en dessous du sternum	
	III B	T4 (tumeur avec extension directe sur la paroi thoracique ou sur la peau avec changements visibles)	N0, N1 (1–3), N2 (4–9) ou ganglions lymphatiques en dessous du sternum	
	III C	Toutes les tailles	N3 (≥ 10 ganglions lymphatiques) ou extension à ≥ 1 ganglions lymphatiques en dessous du sternum ou ≥ 1 sous l'aisselle ou extension à ≥ 1 ganglions lymphatiques près de la clavicule	

Fig. adapté d'après Kalli S et al. Radiographics 2018.