

## 2.1. Urticarias inducibles - Dermografismo

Image



### **Atlas de diagnóstico diferencial de la urticaria**

---

## **2.1. Urticarias inducibles - Dermografismo**

Este tipo de urticaria se presenta tras el roce o rascado y sigue la trayectoria del rascado. Es la forma más frecuente de urticaria inducible, y en sus formas leves (dermografismo fisiológico) puede afectar a un 2-5% de la población<sup>1,2</sup>.

La urticaria dermatográfica o dermografismo sintomático se acompaña de prurito generalizado, que es desproporcionado a las lesiones externas causadas por el roce o el rascado<sup>1</sup>. El dermografismo puede presentarse aislado o asociado a otras formas de urticaria.

Image



2.1.1. El dermografismo se puede demostrar también mediante el uso de un dermografómetro calibrado a distintas presiones o ejerciendo una presión uniforme sobre la piel con cuatro puntas romas de distinto calibre (Fric-Test).

Image



2.1.2. Dermografómetro calibrado. El dispositivo puede calibrarse a distintas presiones, desde la escala 0 (20 g/mm<sup>2</sup>) hasta la 10 (100 g/mm<sup>2</sup>).

Image



2.1.3. Uso del dermografómetro. Mediante una plantilla de apoyo de 10 cm de longitud, se ejerce fricción sobre la piel a distintas presiones, de 20 (dermografismo sintomático) a 60 g/mm<sup>2</sup> (dermografismo fisiológico).

Image



2.1.4. Uso del Fric-Test. Se ejerce una presión uniforme sobre la piel con cuatro puntas romas de distinto calibre, con lo que se aplican cuatro presiones finales distintas sobre la piel.

## **Características específicas de las lesión y claves para el diagnóstico diferencial<sup>3,4</sup>**

- Lesiones habonosas que se producen en el sitio donde se ha ejercido el estímulo (roce, rascado) y desaparecen en menos de 2 h.
- Se pueden reproducir cuando se somete la piel al estímulo adecuado (objeto romo, dermatógrafo, Fric-Test).

# Síntomas de alarma<sup>2</sup>

- Duración de los habones superior a las 24 h.
- Asociación con otras formas de urticaria crónica inducible o espontánea.
- Formación de una ampolla en lugar de habón tras rascado, denominado signo de Darier, signo patognomónico de mastocitoma o urticaria pigmentosa.

Image



## Capítulo 2.1

PDF

[Descargar](#)

**Volver al :**



---

**Atlas Diferencial de la Urticaria**

**Atlas Diferencial de la Urticaria**

See more details

Hide details

.



---

**2.2. Urticarias inducibles - Urticaria por presión**

**2.2. Urticarias inducibles - Urticaria por presión**

See more details

Hide details

## **Referencias**

1. Ferrer M, Veleiro B, Jáuregui I. Urticaria. En: Dávila IJ, Jáuregui I, Olaguibel JM, Zubeldia JM, eds. Tratado de alergología, 2ª ed. Madrid: Ergon, 2015.
2. Sánchez Borges M, González Aveledo L, Caballero Fonseca F, Capriles Hulett A. Review of physical urticarias and testing methods. Curr Allergy Asthma Rep. 2017; 17(8): 51.
3. Maurer M, Fluhr JW, Khan DA. How to approach chronic inducible urticaria. J Allergy Clin Immunol Pract. 2018;6(4): 1.119-1.130.
4. Magerl M, Altrichter S, Borzova E, Giménez-Arnau A, Grattan CE, Lawlor F, chronic inducible urticarias - the EAACI/GA2LEN/EDF/UNEV consensus recommendations 2016 update and revision. Allergy. 2016; 71(6): 780-802.

---

**Source URL:**

<https://www.pro.novartis.com/es-es/dermatologia/urticaria/atlas-de-la-urticaria/21-urticarias-inducibles-dermografismo>