

10.1 Eritema fijo pigmentario (medicamentoso)

Image



Atlas de diagnóstico diferencial de la urticaria

10.1 Eritema fijo pigmentario (medicamentoso)

Características específicas de la lesión

- Máculas eritematoso-violáceas, circulares u ovales, únicas o múltiples, con una localización específica de forma recurrente, a veces con clínica ampollosa¹. Dejan una hiperpigmentación residual de larga duración.
- En un 85-100% están ocasionadas por medicamentos².
- Son lesiones habitualmente asintomáticas, pero en ocasiones provocan prurito, escozor (de intensidad proporcional a la inflamación existente) o dolor si hay erosión.

Image



10.1.1. Placas infiltradas del abdomen residuales pigmentadas que han sufrido episodios previos de agudización formando ampollas en superficie.

Image



10.1.2. Placas pigmentadas residuales fijas secundarias a ingesta siempre del mismo fármaco.

Image



10.1.3. Placa eritematosa incipiente bien delimitada redondeada en el dorso de la mano tras ingesta hace 24 h de antiinflamatorio, en fase aguda de eritema fijo pigmentario.

Image



10.1.4. Eritema fijo pigmentario medicamentoso extenso en el dorso de la mano.

Síntomas de alarma

Histológicamente, en el estadio agudo existe cierta similitud con el eritema exudativo multiforme, con pérdida de las líneas celulares y necrosis de la epidermis baja. En las lesiones menos activas, la epidermis está conservada, pero existe un edema en la dermis y un infiltrado perivascular linfocítico.

Puntos clave para el diagnóstico diferencial²

- Recurrencia de las lesiones en el mismo lugar fijo.
- Placa/s redondeadas bien definidas, rojo amarronadas y edematosas, seguidas de hiperpigmentación.

- Reproducción de la enfermedad al administrar el fármaco o alimento responsable³.

Image



Capítulo 10.1.

PDF

[Descargar](#)

Volver al :



Atlas Diferencial de la Urticaria

Atlas Diferencial de la Urticaria

[See more details](#)

Hide details

.



11. Picadura de insecto

11. Picadura de insecto

See more details

Hide details

Referencias

1. Shiohara T. Fixed drug eruption: pathogenesis and diagnostic tests. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2009; 9(4): 316-321.
2. Gendernalik SB, Galeckas KJ. Fixed drug eruptions: a case report and review of the literature. Cutis. 2009; 84(4): 215-219.
3. Flowers H, Brodell R, Brents M, Wyatt JP. Fixed drug eruptions: presentation, diagnosis, and management. South Med J. 2014; 107(11): 724-727.

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/es-es/dermatologia/urticaria/atlas-de-la-urticaria/101-eritema-fijo-pigmentario-medicamentoso>