# **U** NOVARTIS

Tratamiento temprano y de alta eficacia en la EM Image

**Esclerosis Múltiple** 




Tratamiento temprano y de alta eficacia en la EM



- Estrategia early & high
- Riesgo de la enfermedad vs. riesgo del tratamiento

Tratamiento temprano y de alta eficacia en la EM
Estrategia early & high
El <b>daño neurológico</b> comienza en las primeras fases de la EM y puede incluso preceder a los síntomas clínicamente evidentes.¹
El <b>tratamiento precoz puede mejorar los resultados clínicos a largo plazo</b> al minimizar la acumulación de daño neurológico que se produce en las primeras fases de la enfermedad. <sup>1</sup>



Adaptado de Ziemssen, et al. 2016.<sup>2</sup>




Aunque no hay una definición universal de **terapias de alta eficacia** (TAE), algunos expertos consideran que un tratamiento es una TAE si se puede demostrar un efecto terapéutico sustancial en  $\geq 1$  resultado de inflamación/desmielinización, pero también en  $\geq 1$  resultado de progresión de la enfermedad.<sup>3</sup>

En el tratamiento de la EM se han implementado **diversos enfoques terapéuticos.** Un **enfoque tradicional** ha sido el escalonado, que consiste en **iniciar** con tratamientos de **menor eficacia pero mayor** seguridad, considerando la transición a fármacos de mayor eficacia en caso de actividad persistente de la enfermedad, priorizando siempre la seguridad del paciente.<sup>4</sup>

Por otro lado, un **enfoque contemporáneo** aboga por el uso de **terapias de alta eficacia desde el inicio** del tratamiento, fundamentado en la evidencia actual sobre la progresión de la discapacidad y las limitaciones de las herramientas predictivas actuales. Este enfoque también se sustenta en el desarrollo de nuevos fármacos que ofrecen una mayor eficacia y un perfil de seguridad mejorado.<sup>4</sup>

El tratamiento temprano con TME de alta eficacia reduce significativamente el riesgo de progresión confirmada de la enfermedad.<sup>5</sup>

### **Image**



Living like you.6

El **inicio temprano** de un TME de alta eficacia en los 2 años siguientes al comienzo de la enfermedad se asocia con una **menor discapacidad a los 6-10 años** que el inicio tardío (4-6 años tras el comienzo de la enfermedad).<sup>5</sup>


Este enfoque aprovecha la llamada «ventana de oportunidad» con la esperanza de maximizar los beneficios clínicos a largo plazo.<sup>7</sup>

Vídeo: Conversaciones entre expertos

Vídeo: Ágora 2022

Con el objetivo de <b>maximizar la salud cerebral</b> a lo largo de toda la vida, se publicó un <b>consenso internacional de recomendaciones</b> para mejorar el diagnóstico, el manejo y el tratamiento de la EM con la siguiente propuesta de <b>estrategia terapéutica:</b> 8
Image

#### Objetivo: maximizar la salud cerebral a lo largo de toda la vida8





**EM:** esclerosis múltiple; **TAE:** terapias de alta eficacia; **TME:** tratamientos modificadores de la enfermedad.

1. Freeman L, et al. CNS Drugs. 2022 Dec;36(12):1285-1299. 2. Ziemssen T, et al. J Neurol. 2016;263:1053-1065. 3. Filippi M, et al. J Neurol. 2022 Oct;269(10):5382-5394. 4. Stankiewicz JM, et al. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm 2020;7:e636. 5. He A, et al. Lancet Neurol. 2020;19(4):307-316. 6. Living Like You. Eficacia alta desde el principio. Disponible en: https://www.livinglikeyou.com/high-efficacy-early7. Casanova B, et al. J Pers Med. 2022 Jan 17;12(1):119. 8. Giovannoni G, et al. Mult Scler Relat Disord. 2016;9(Suppl 1):S5-S48.

## Tratamiento temprano y de alta eficacia en la EM

### Riesgo de la enfermedad vs. riesgo del tratamiento

Las personas con EM y los profesionales sanitarios que las tratan deben **sopesar los niveles de eficacia potencialmente más elevados** de algunos de los nuevos tratamientos **frente a sus perfiles de riesgo individuales.**<sup>1</sup>

Debido a los problemas de **seguridad** percibidos en los tratamientos de alta eficacia, en muchas ocasiones se puede optar por el inicio de un tratamiento de baja eficacia. Sin embargo, el uso de **tratamientos de baja eficacia** puede provocar un **empeoramiento más rápido** de la enfermedad y una **progresión** de la

discapacidad en comparación con los tratamientos de alta eficacia.<sup>2</sup>

**Equilibrar la eficacia frente a la carga terapéutica** es esencial para la elección del tratamiento modificador de la enfermedad en cada paciente con EM.<sup>3</sup>

La elección entre fármacos debe basarse en una evaluación beneficio-riesgo y adaptarse a las necesidades de cada paciente en un diálogo entre el paciente y el neurólogo tratante.<sup>4</sup>

EM: esclerosis múltiple.

- **1.** Giovannoni G, et al. Mult Scler Relat Disord. 2016;9(Suppl 1):S5–S48. **2.** Merkel B, et al. Autoimmun Rev. 2017. **3.** Sørensen PS. J Neurol Sci. 2011;311 Suppl 1:S29-S34.
- **4.** Sorensen PS. Acta Neurol Scand. 2017;136(3):168-186.

#### **Source URL:**

https://www.pro.novartis.com/es-es/neurologia/esclerosis-multiple/tratamiento-temprano-y-de-alta-eficacia-en-la-em