CardiovascularPro
Image



CardiovascularPro

Patologías

Aterosclerosis

La aterosclerosis es un síndrome caracterizado por el depósito e infiltración de sustancias lipídicas en la capa íntima de las paredes de las arterias, provocando una reacción inflamatoria y la multiplicación y migración de diversos tipos celulares, que van produciendo estrechamientos de la luz arterial[1].
La enfermedad aterosclerótica es la causa más frecuente de morbimortalidad en nuestro entorno[2].

Descubre el c-LDL →

Descubre la Lp(a) →

Image



Espacio ciencia

Accede a Espacio Ciencia

TheNewEVATimes

TheNewEVATimes

Boletín de actualidad sobre la enfermedad vascular aterosclerótica, inclisirán y Lp(a). No te pierdas las publicaciones, congresos y eventos más relevantes.

See more details

Hide details

Novedades

Image

CardioTV | Reaprendiendo de Lípidos

Vídeo | 17 minutos

Más allá de los ensayos clínicos: eficacia y seguridad de inclisirán en el día a día.

Dr. Javier Mora Robles, Dr. Carlos Arellano Serrano, Dra. Laura Pérez Gómez

Web Link
Ver vídeo
Image

CardioTV | Explorando la Lp(a)

Vídeo | 17 mins

Capítulo 1 . ¿Qué debe saber el cardiólogo sobre la medición de la Lp(a)?

Web Link
Ver vídeo
Image



Cardiopodcast | 4x07

Podcast | 33 mins

Nuevas terapias hipolipemiantes en la práctica clínica: consenso de sociedades

Dra. Rosa Fernández Olmo, Dr. Borja Quiroga, Dr. Román Freixa.

Web Link
Escuchar podcast

Productos

Image

Image

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.
LEQVIO® y el logo de LEQVIO® son marcas registradas de Novartis AG. Con licencia de Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

Image

Solicitud de información médica

¿Tienes una pregunta específica sobre alguno de nuestros productos o patologías?

Contacta con nuestro equipo de Información Médica

Abreviaturas

c-LDL: colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad; **IC**: Insuficiencia Cardiaca; **Lp(a)**: lipoproteína (a)

Referencias

1. Galkina E, Ley K. Immune and inflammatory mechanisms of atherosclerosis (*). Annu Rev Immunol. 2009;27:165-97. doi: 10.1146/annurev.immunol.021908.132620.

2. Vivas D, et al. Uso de nuevas terapias hipolipemiantes en la práctica clínica. Consenso SEC/SEA/SEEN/SEMFYC/SEMERGEN/SEMG/SEN/SEACV/S.E.N. REC CardioClinics. 2024. doi:10.1016/j.rccl.2024.06.002.

3. Hunt SA, Abraham WT, Chin MH, Feldman AM, Francis GS, Ganiats TG, et al. 2009 Focused update incorporated into the ACC/AHA 2005 Guidelines for the Diagnosis and Management of Heart Failure in Adults A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines Developed

in Collaboration With the International Society for Heart and Lung Transplantation.

PRECIO Y CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN

Con receta Médica. Reembolsado por el SNS, dispensación hospitalaria sin cupón precinto.
PVLn LEQVIO 284 mg SOLUCION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA, 1 jeringa precargada con protector de aguja 2.202 €.
Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.
LEQVIO® y el logo de LEQVIO® son marcas registradas de Novartis AG. Con licencia de Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

Ficha Técnica de LEQVIO®

PRECIO Y CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN
Con receta Médica. Reembolsado por el SNS, aportación normal. PVL Entresto 24 mg/26 mg 28 comprimidos 59,36 €. PVL Entresto 49 mg/51 mg 56 comprimidos 118,72 €. PVL Entresto 97 mg/103 mg 56 comprimidos 118,72 €. La indicación Insuficiencia cardiaca pediátrica está pendiente de tramitación de precio y condiciones de financiación.

Ver ficha técnica Entresto®

Source URL: *https://www.pro.novartis.com/es-es/cardiovascularpro*