


CardiovascularPro

Image



CardiovascularPro

Patologías


Aterosclerosis

La aterosclerosis es un síndrome caracterizado por el depósito e infiltración de sustancias lipídicas en la capa íntima de las paredes de las arterias, provocando una reacción inflamatoria y la multiplicación y migración de diversos tipos celulares, que van produciendo estrechamientos de la luz arterial¹.

La enfermedad aterosclerótica es la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad en nuestro entorno².

[Descubre la Lp\(a\) →](#)

Image



Novedades

Image



CardioTV | Reaprendiendo de Lípidos

Vídeo | 17 minutos


Más allá de los ensayos clínicos: eficacia y seguridad de incluirán en el día a día.

Dr. Javier Mora Robles, Dr. Carlos Arellano Serrano, Dra. Laura Pérez Gómez

Web Link

[Ver vídeo](#)

Image



CardioTV | Explorando la Lp(a)

Vídeo | 17 mins

Capítulo 1 . ¿Qué debe saber el cardiólogo sobre la medición de la Lp(a)?

Web Link

[Ver vídeo](#)

Image



Cardiopodcast | 4x07

Podcast | 33 mins

Nuevas terapias hipolipemiantes en la práctica clínica: consenso de sociedades

Dra. Rosa Fernández Olmo, Dr. Borja Quiroga, Dr. Román Freixa.

Web Link

[Escuchar podcast](#)

Productos

Image



Image



▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

LEQVIO® y el logo de LEQVIO® son marcas registradas de Novartis AG. Con licencia de Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

Image



Solicitud de información médica

¿Tienes una pregunta específica sobre alguno de nuestros productos o patologías?

[Contacta con nuestro equipo de Información Médica](#)

Abreviaturas

c-LDL: colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad; **IC:** Insuficiencia Cardíaca; **Lp(a):** lipoproteína (a)

Referencias

1. Galkina E, Ley K. Immune and inflammatory mechanisms of atherosclerosis (*). *Annu Rev Immunol*. 2009;27:165-97. doi: 10.1146/annurev.immunol.021908.132620.
2. Vivas D, et al. Uso de nuevas terapias hipolipemiantes en la práctica clínica. Consenso SEC/SEA/SEEN/SEMFYC/SEMERGEN/SEMG/SEN/SEACV/S.E.N. REC CardioClinics. 2024. doi:10.1016/j.rccl.2024.06.002.
3. Hunt SA, Abraham WT, Chin MH, Feldman AM, Francis GS, Ganiats TG, et al. 2009 Focused update incorporated into the ACC/AHA 2005 Guidelines for the Diagnosis and Management of Heart Failure in Adults A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines Developed in Collaboration With the International Society for Heart and Lung Transplantation.

PRECIO Y CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN

Con receta Médica. Reembolsado por el SNS, dispensación hospitalaria sin cupón precinto. PVLn LEQVIO 284 mg SOLUCION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA, 1 jeringa precargada con protector de aguja 2.202 €.

Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

LEQVIO® y el logo de LEQVIO® son marcas registradas de Novartis AG. Con licencia de Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

[Ficha Técnica de LEQVIO®](#)

PRECIO Y CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN

Con receta Médica. Reembolsado por el SNS, aportación normal. PVL Entresto 24 mg/26 mg 28 comprimidos 59,36 €. PVL Entresto 49 mg/51 mg 56 comprimidos 118,72 €. PVL Entresto 97 mg/103 mg 56 comprimidos 118,72 €. La indicación Insuficiencia cardiaca pediátrica está pendiente de tramitación de precio y condiciones de financiación.

[Ver ficha técnica Entresto®](#)

Source URL: <https://www.pro.novartis.com/es-es/cardiovascularpro>