NOVARTIS

¿Cómo diagnosticar la APs axial en la práctica clínica?

Image

Image

PsAXiON
IMPULSANDO EL ABORDAJE DE LA
MANIFESTACIÓN AXIAL EN APs

PsAXion

¿Cómo diagnosticar la APs axial en la práctica clínica?

El Dr. Manuel José Moreno, reumatólogo del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, nos expone las claves para diagnosticar a los pacientes con APs axial de manera temprana y, de este modo, mejorar su calidad de vida.

VIDEO

Impulsando el abordaje de la manifestación axial en APs

Con receta Médica. Diagnóstico Hospitalario. Reembolsado por el SNS, se limita su dispensación, sin necesidad de visado, a los pacientes no hospitalizados, en los Servicios de Farmacia de los Hospitales; por lo tanto irá desprovisto de cupón precinto. PVLn Cosentyx 75 mg solución inyectable 1 jeringa precargada 0,5 ml 571,56 €. PVLn Cosentyx 150 mg solución inyectable 1 pluma precargada 1 ml 571,56 €. PVLn Cosentyx 150 mg solución inyectable 2 jeringas precargadas 1 ml 1.143,11 €. PVLn Cosentyx 150 mg solución inyectable 2 plumas precargadas 1 ml 1.143,11 €. PVLn Cosentyx 300 mg solución inyectable 1 pluma precargada 2 ml 1.143,11 €. La indicación Artritis Idiopática Juvenil no está financiada.

Ver Ficha Técnica de COSENTYX®

Source URL:
https://www.pro.novartis.com/es-es/reumatologia/psaxion/diagnosticar-aps-axial-practica-clinica