

Diagnostic
Image




Image



Diagnostic

Retrouvez des cas cliniques, des fiches mémos et d'autres ressources pour vous aider dans le diagnostic de l'urticaire chronique spontanée.



Les différentes formes cliniques d'urticaire et les diagnostics différentiels

Les différentes formes cliniques d'urticaire et les diagnostics différentiels

L'urticaire se caractérise par des papules qui démangent et/ou un angioœdème. Cependant, l'érythème lié à la papule peut être plus difficile à détecter sur certains types de peau...

Plus de détails

Masquer



Prise en charge de l'urticaire chronique spontanée selon les dernières recommandations françaises et internationales

Prise en charge de l'urticaire chronique spontanée selon les dernières recommandations françaises et internationales

L'urticaire chronique spontanée touche environ 0,5 à 1 % de la population à travers le monde. Afin de vous accompagner dans le diagnostic et la prise en charge des patients atteints...

Plus de détails

Masquer



L'évaluation de l'Urticaire Spontanée en pratique clinique

L'évaluation de l'Urticaire Spontanée en pratique clinique

Dans le cadre de la prise en charge des patients atteints d'urticaire chronique spontanée (UCS), l'évaluation de l'activité et de la sévérité de la maladie...

Plus de détails

Masquer



Bilan diagnostique de l'urticaire chronique spontanée : que faut-il tester ?

Bilan diagnostique de l'urticaire chronique spontanée : que faut-il tester ?

Selon les dernières recommandations, les tests diagnostiques de l'UCS sont limités à la numération de la formule sanguine (NFS), au dosage de la protéine C réactive (CRP)...

Plus de détails

Masquer

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/fr-fr/aires-therapeutiques/dermatologie/UCS/diagnostic>