


Prise en charge de l'urticaire chronique spontanée selon les dernières recommandations françaises et internationales : diagnostic et évaluation

Image



Image



Prise en charge de l'urticaire chronique spontanée selon les dernières recommandations françaises et internationales : diagnostic et évaluation

L'urticaire chronique spontanée touche environ 0,5 à 1 % de la population à travers le monde¹. Afin de vous accompagner dans le diagnostic et la prise en charge des patients atteints d'UCS, retrouvez dans la vidéo ci-dessous les **témoignages d'experts** des **Dr**

Pascale MATHELIER-FUSADE et **Dr Antoine BADAoui** sur les enjeux du diagnostic de l'urticaire en dermato-allergologie.



VIDEO

Également à votre disposition, une **brochure clé en main**, conforme aux recommandations internationales 2021 et françaises 2019 permettant de répondre aux 4 questions suivantes:

Image



Quand faut-il suspecter l'UCS ?

- Les signes caractéristiques de l'urticaire
- Différence entre urticaire aigüe et urticaire chronique (UC)
- Fréquences des signes et symptômes
- Facteurs déclenchants et différences entre UCS et UC inducible (UCI)

Image



Comment se fait le diagnostic ?

- Histoire de la maladie/anamnèse
- Examen clinique
- Tests diagnostics
- Confirmation du diagnostic et élimination des diagnostics différentiels

Image



Comment évaluer le patient ?

- Les différents scores d'évaluation de la pathologie
- Zoom sur le score de l'UCT mis en avant dans les recommandations internationales 2021

Image



Quelles sont les recommandations de prise en charge thérapeutique de l'UCS ?

- La règle des 3 A en anglais : Adjust (Ajuster), Assess (Évaluer), Act (Agir)
- La prise en charge de l'UCS selon les recommandations internationales et françaises

Image



Immunologie
Urticaire

Diagnostic et prise en charge des patients atteints d'Urticaire Chronique Spontanée (UCS)

**Selon les recommandations internationales 2022
et les recommandations françaises 2019 ^{1,2}**

 **NOVARTIS** | Reimagining Medicine

Diagnostic et prise en charge de l'UCS

PDF

[Téléchargez](#)

Pour en savoir plus, téléchargez la brochure "Diagnostic et prise en charge de l'UCS" et obtenez des réponses à ces questions.

UCS : Urticaire Chronique Spontanée

Référence

1. Maurer M *et al.* The burden of chronic spontaneous urticaria is substantial: Real-world evidence from ASSURE-CSU. *Allergy*. 2017, 72:2005–2016.

Articles associés



4 mins

Les différentes formes cliniques d'urticaire et les diagnostics différentiels

Urticaire chronique spontanée

Article - 18 nov 2024

4 mins

Les différentes formes cliniques d'urticaire et les diagnostics différentiels

L'urticaire se caractérise par des papules qui démangent et/ou un angiœdème. Cependant, l'érythème lié à la papule peut être plus difficile à détecter sur certains types de peau...

Urticaire chronique spontanée

[Facebook](#) [X](#) [LinkedIn](#)

Plus de détails

Masquer

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/fr-fr/aires-therapeutiques/dermatologie/UCS/diagnostic/prise-en-charge-de-lurticaire-chronique-spontanee>