ゾレア（XOL）FAQ

ゾレア **FAQ**

製品FAQは医療に従事する先生方からよくご質問いただく内容をまとめたものです。記載している情報はあくまで参考情報としてお取り扱いいただき、医療上のご判断は医療従事者の裁量と責任のもとに行っていただきますようお願い致します。
製品のご使用にあたっては、最新の電子化された添付文書（電子添文）をご確認ください。製品に関してご不明な点がございましたら、弊社お問い合わせ窓口にお問い合わせください。

弊社製品の使用期限は専用ページでお調べいただけます。
薬価基準および各種コードはこちらをご確認ください。

用法及び用量

安全性

製剤

その他

1.用法及び用量

ゾレアの注射部位はどこですか

□□□

□□□

□□□

□□□

投与の約30分前に冷蔵庫から取り出し、外箱に入れたまま室温（25℃以下）に戻してください。室温に戻した後、すぐに使用しない場合は、再度冷蔵保存（2-8℃）することが可能ですが、室温での保存時間は累計48時間を超えないようにしてください。

（参考）

ゾレア皮下注シリンジ/皮下注ペン電子添文14.1.2

4.その他

自己投与後のゾレア皮下注シリンジおよびゾレア皮下注ペンの廃棄方法はどうすればいいですか。

□□□

Source URL: *https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/xolair/faq*