NOVARTIS

□□□□□ FAQ

□□□□□ FAQ

□□FAQ□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□
Gibiansky, E. et al.□J. Clin. Pharmacol. 2011; 51(6): 842-856
Wire, M.B. et al.□Clin. Pharmacol. Ther. 2018; 104(6): 1199-1207

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

1) □□□□□□ □□□□9.4□9.5

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

1) □□□□□□ □□□□9.6 □□□

2) □□□□□□□□□□□□□□□□□□VII-5□□3□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□?

□□□□□□□□□□□AST□ALT□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□50mg□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□AUC0-∞□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Child-Pugh □□□□5□6□□41%□□□□□□□□□□□□Child-Pugh□□□□7□9□□93%□□□□□□□□□□□Child-Pugh □□□□10□□□□80%□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□AUC0-∞□□□□□□□□□□□□□□□□□□□34.46□174.99□35.86□127.74□57.64□263.22□32.26□263.51μg□hr/mL□□□□□□□□□□□□□

□□□□

1) □□□□□□□□□□□□9.3□16.6.2

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

2.□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ VIII-5□

3.□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

1) □□□□□□ □□□□ 16.2.1

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

1) □□□□□□□ □□□□□□□□

4.□□□

**□□□□□□□

□□□□

1) Williams, D.D. et al.□Clin. Ther. 2009; 31(4): 764-776

□□□□

□□□□

1) □□□□□□□□□□□□□□□□□ Ⅷ-9□

5.□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□14.1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□

Source URL: *https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/revolade/faq*