

□□□□2. □□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□**2018**

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2. □□□□□□□□□□□□



広島大学大学院医系科学研究科 皮膚科学 教授
秀道広 先生

VIDEO

1. ガイドライン改定のポイントと蕁麻疹診療の課題

蕁麻疹診療ガイドライン2018のポイント

今回の改定の概要¹⁾

2011年版のガイドライン作成時以降に発表されたエビデンスを検証し、グローバルガイドライン（国際ガイドライン²⁾）との整合性を取るとともに、わが国の現状を踏まえ、また、医師、患者および医療関係者がどのように蕁麻疹を捉え、問題を解決するために行動すべきかを示すことを目指して作成された。

今回の改定の特徴²⁾

蕁麻疹診療に関する情報を実用性の観点からより系統的に整理し、より洗練した行動指針を明示した。

具体的な変更点³⁾

1. 主たる病型の分類の微修正
2. 治療アルゴリズムの改定
3. 蕁麻疹の病型毎の治療法のエビデンスと推奨度の整備
4. 19の基本的行動指針の提示
5. 「評価」の項の新設

1. □□□□□□□□□□□□□□□□

1. □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□

3. 推奨度とエビデンスレベル

蕁麻疹診療ガイドライン2018の推奨度とエビデンスレベル

推奨度	説明	推奨度とエビデンスレベル	臨床的意義
1: 強い推奨 (recommend)	推奨された治療によって得られる利益が大きく、かつ、治療によって生じる負担も少ないと考えられる	1A	根拠のレベルが高く、治療によって得られる利益は大きく、かつ、生じる害や負担も少ないと考えられる。したがって、医師は、推奨した治療を行うことが勧められる。
2: 弱い推奨 (suggest)	推奨した治療によって得られる利益の大きさは不確実である、または、治療によって生じる害や負担が懸念されていると考えられる		根拠のレベルは低い (B)、または、とても低い (C)。即ち、治療によって得られる利益は大きく、かつ、生じる害や負担も少ないと考えられる。したがって、医師は、根拠が十分でないことを理解したうえで、推奨した治療を行うことが勧められる。
エビデンスレベル	研究デザイン	説明	
A (高い)	<ul style="list-style-type: none"> 質の高い、かつ、多数が一貫した結果の無作為比較試験 無作為比較試験のメタアナリシス 	結果はほぼ確実であり、今後研究が新しく行われても結果が大きく変化する可能性は少ない	1B 1C
B (低い)	<ul style="list-style-type: none"> 不一致な結果の無作為比較試験 質に疑問がある、または、少数の無作為比較試験 非無作為比較試験* 多数が一貫した結果の前向き比較試験や観察研究† 	結果を支持する研究があるが十分ではないため、今後研究が行われた場合に結果が大きく変化する可能性がある	2A 2B 2C
C (とても低い)	少数の前向き比較試験や観察研究、症例報告、専門家の意見	結果を支持する質の高い研究がない	

(推奨度の説明: 高いほどエビデンスレベルは高いためガイドラインの2018年版の標準に近づき)

*1: フォロワー比較試験を含む

*2: ランダム化比較試験の比較群、または、非無作為比較試験や観察研究として評価したものを指す

3. □□□□□□□□□□

3. □□□□□□□□□□

□□□□

□□□□

蕁麻疹の主たる病型¹⁾

- I. 特発性の蕁麻疹 spontaneous urticaria
 - 1. 急性蕁麻疹 acute spontaneous urticaria (発症後6週間以内)
 - 2. 慢性蕁麻疹 chronic spontaneous urticaria (発症後6週間以上)
- II. 刺激誘発型の蕁麻疹 (特定刺激ないし負荷により症状を誘発することができる蕁麻疹) inducible urticaria^{*}
 - 1. アレルギー性の蕁麻疹 allergic urticarial
 - 2. 食物依存性運動誘発アナフィラキシー FDEIA
 - 3. 非アレルギー性の蕁麻疹 non-allergic urticaria
 - 4. アスピリン蕁麻疹 (不耐症による蕁麻疹) aspirin-induced urticaria (urticaria due to intolerance)
 - 5. 物理性蕁麻疹 physical urticaria (機械性蕁麻疹 mechanical urticaria, 寒冷蕁麻疹 cold urticaria, 日光蕁麻疹 solar urticaria, 温熱蕁麻疹 heat urticaria, 遅延性圧蕁麻疹 delayed pressure urticaria, 水蕁麻疹 aquagenic urticaria)
 - 6. アリン性蕁麻疹 cholinergic urticaria
 - 7. 接触蕁麻疹 contact urticaria
- III. 血管性浮腫 angioedema
 - 1. 特発性の血管性浮腫 idiopathic angioedema
 - 2. 刺激誘発型の血管性浮腫 inducible angioedema (振動血管性浮腫 vibratory angioedema も含む)
 - 3. アラジン二酸化窒素の血管性浮腫 bradykinin mediated angioedema
 - 4. 遺伝性血管性浮腫 hereditary angioedema (HAE)
- IV. 蕁麻疹関連疾患 urticaria associated diseases
 - 1. 蕁麻疹様血管炎 urticarial vasculitis
 - 2. 色素性蕁麻疹 urticaria pigmentosa
 - 3. Schvartzler症候群およびクワリリン関連早期熱症候群

^{*} 追加の中心症 2では、6週間以上経過後に再発誘発型の蕁麻疹を含むChronic urticaria 2に分類される

4. □□□□□□

4. □□□□□□

□□□□

□□□□

□□□□□□□□

□□□□□

□□□□

□□□□□□

□□□□

PFS□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Image



Source URL: https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/xolair/urticarial/guideline_03