NOVARTIS

□□□□□□□□□□[HARRIER]

□□□□□□□□□□□□□AMD□

□□□Ⅲ□□□□HARRIER□C002□□□[4□5□7□8□]□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□20200027□□□□□□□□□
5□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□20200028□□□□□□□□□
7□Dugel PU, et al. Ophthalmology 2020□127□1□□72-84□20190561□
COI□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Image



※2 □□□□□□□□□□□

□□□□	□□□□
16□	• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□5□□□□□□□□□□□□□□□□□ • 12□□□□□□□□□□□□□□□□□□3□□□□□□□□□□□75μm□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ • □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□※4□□□□15□□□□□□□□□84□□□□□□□□□□□□□48□□□96□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□※4□□□□15□□□□□□□□□□□□□48□□□96□□
- □□□□□□□12□□□□□□□□□□□□□□□□□□96□□
- □□□□□□□□12□□□□□□□□□□□□□□□□□□96□□
- 16□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□16□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□36□48□□
- CNV□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□12□□48□□□96□□
- CNV□□□□□□□□□□□□□□□12□□48□□□96□□
- IRF□□□SRF□□□□□□□□□□□□□□□16□□48□□□96□□
- □□□□□□□□□□□□□□sub-retinal pigment epithelium□sub-RPE□fluid□□□□□□□□□□□□□□□16□□48□□□96□□□□

※4 ETDRS□□□□□□□ETDRS□□□□□□□□□□□□□□□□□□4m□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

項目		ベオビュ 6mg群 (n=370)	アフリベルセプト 2mg群 (n=369)
性別、症例数（%）	男性	160 (43.2)	157 (42.5)
	女性	210 (56.8)	212 (57.5)
年齢、症例数（%）	50～64歳	44 (11.9)	28 (7.6)
	65～74歳	124 (33.5)	126 (34.1)
	75～84歳	150 (40.5)	167 (45.3)
	≧85歳	52 (14.1)	48 (13.0)
	平均値±標準偏差	74.8±8.58	75.5±7.87
最高矯正視力スコア（文字）、平均値±標準偏差		61.5±12.59	60.8±12.93
中心窩網膜厚（μm）、平均値±標準偏差		473.6±171.39	465.3±151.21
CNV病変サブタイプ、症例数（%）	predominantly classic型※1 CNV	154 (41.6)	(n=365) 144 (39.5)
	minimally classic型CNV	33 (8.9)	(n=365) 34 (9.3)
	occult型※2 CNV	183 (49.5)	(n=365) 187 (51.2)
CNV病変サイズ（mm^2）、平均値±標準偏差		2.6±2.76	2.9±3.95
IRFまたはSRF、症例数（%）	あり	330 (89.2)	332 (90.0)
	なし	40 (10.8)	37 (10.0)
sub-RPE fluid、症例数（%）	あり	125 (33.8)	127 (34.4)
	なし	245 (66.2)	242 (65.6)

※1 predominantly classic□□pure classic□□□□□□
※2 3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□pigment epithelial detachment□PED□□□□□PED□□□□□□□□□□□□□□□□□□1□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□