

Image

JULIET試験

JULIET試験で使用頻度が高かった薬剤 (15%以上)

薬剤名	使用頻度 n (%)
リツキシマブ	60 (54.1)
ゲムシタビン	40 (36.0)
デキサメタゾン	26 (23.4)
エトポシド	25 (22.5)
シタラビン	21 (18.9)
シスプラチン	21 (18.9)

※ブリッジング療法で利用できる薬剤には、制限がありません
※ブリッジング療法は、上記薬剤の単剤又は併用で行われました

2025年3月

Image

B-ALL 再発又は難治性のCD19陽性のB-ALL患者

ELIANA試験及びENSIGN試験の併合解析

ELIANA試験及びENSIGN試験で使用頻度が高かった薬剤 (15%以上)

薬剤名	使用頻度 n (%)
メトトレキサート	81 (63.8)
シタラビン	67 (52.8)
ビンクリスチン	65 (51.2)
デキサメタゾン	41 (32.3)
メルカプトプリン	39 (30.7)
エトポシド	39 (30.7)
シクロホスファミド	38 (29.9)
ベグ化アスパラガーゼ (国内未承認)	29 (22.8)
ヒドロコルチゾン	23 (18.1)
ブレドニソン	22 (17.3)

※ブリッジング療法で利用できる薬剤には、制限がありません
※ブリッジング療法は、上記薬剤の単剤又は併用で行われました

Image

■ ELIANA試験及びENSIGN試験の併合解析

ELIANA試験及びENSIGN試験で使用頻度が高かった薬剤(15%以上)

薬剤名	使用頻度 n (%)
メトトレキサート	81 (63.8)
シタラビン	67 (52.8)
ビンクリスチン	65 (51.2)
デキサメタゾン	41 (32.3)
メルカプトプリン	39 (30.7)
エトポシド	39 (30.7)
シクロホスファミド	38 (29.9)
ペグ化アスパラガーゼ (国内未承認)	29 (22.8)
ヒドロコルチゾン	23 (18.1)
プレドニゾン	22 (17.3)

※ブリッジング療法で利用できる薬剤には、制限がありません

※ブリッジング療法は、上記薬剤の単剤又は併用で行われました

□□□□□□□□□□2025□3□□□□

Image

■ ELARA試験

ELARA試験で使用頻度が高かった薬剤 (5%以上)

薬剤名	使用頻度 n (%)
リツキシマブ	21 (21.6)
デキサメタゾン	11 (11.3)
ゲムシタビン	10 (10.3)
オキサリプラチン	7 (7.2)
プレドニゾロン	7 (7.2)
エトポシド	6 (6.2)
シクロホスファミド	5 (5.2)
ビンクリスチン	5 (5.2)

※ブリッジング療法で使用できる薬剤には、制限がありません
※ブリッジング療法は、上記薬剤の単剤又は併用で行われました

Image

■ ELARA試験

ELARA試験で使用頻度が高かった薬剤 (5%以上)

薬剤名	使用頻度 n (%)
リツキシマブ	21 (21.6)
デキサメタゾン	11 (11.3)
ゲムシタビン	10 (10.3)
オキサリプラチン	7 (7.2)
プレドニゾロン	7 (7.2)
エトポシド	6 (6.2)
シクロホスファミド	5 (5.2)
ビンクリスチン	5 (5.2)

※ブリッジング療法で使用できる薬剤には、制限がありません
※ブリッジング療法は、上記薬剤の単剤又は併用で行われました

□□□□□□□□

□□□□□□□□
□□□□□□□□

Image



Image



キムリアの治療施設/医師要件

Image



紹介元施設から治療施設宛の
キムリア患者紹介用フォーム

Image

CellChain™ PRO

キムリア治療専用
オーダーシステム

Source URL: <https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/kymriah/treatment/bridging>