□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

Image



□□□□□□□□□□□□AOSD□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□AOSD□□□□□□□□□□□□□□□□□150mg□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□sJIA□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□sJIA□□□□□□□□□□□□□□□□150mg□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

全身型若年性特発性関節炎（SJIA）治療におけるイラリス®の使用指針

2024年6月

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□sJIA□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□sJIA□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□

Image



・既存治療で効果不十分な家族性地中海熱
・TNF受容体関連周期性症候群
・高IgD症候群（メバロン酸キナーゼ欠損症）

イラリス®皮下注射液150mgの使用指針

2025年4月版

ヒト型抗ヒトIL-1βモノクローナル抗体 薬価基準収載

イラリス®皮下注射液150mg カナキヌマブ（遺伝子組換え）注射液

注意一般時等の処方箋により使用すること

1. 警告
1.1 本剤投与により、敗血症を含む重篤な感染症等があらわれることがあり、本剤との関連性は明らかではないが、悪性腫瘍の発現も報告されている。本剤が疾病を完治させる薬剤ではないことも含め、これらの情報を患者に十分説明し、患者が理解したことを確認した上で、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ本剤を投与すること。また、本剤の投与において、重篤な感染症等の副作用により、致命的な結果をたどることがあるので、緊急時に十分に対応できる医療施設及び医師のもとで投与し、本剤投与後に副作用が発現した場合には、速やかに担当医に連絡するよう患者に注意を与えること。[1.2, 2.1, 8.1, 8.2, 8.6, 9.1.1, 9.1.3, 9.1.4, 11.1.1参照]
1.2 敗血症等の致命的な感染症が報告されているため、十分な観察を行うなど感染症の発現に注意すること。[1.1, 2.1, 8.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.3, 9.1.4, 11.1.1参照]
1.3 本剤についての十分な知識と適応疾患の治療の知識・経験をもつ医師が使用すること。

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）
2.1 重篤な感染症の患者［感染症が悪化するおそれがある。］[1.1, 1.2, 8.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.3, 9.1.4, 11.1.1参照]
2.2 活動性結核の患者［症状が悪化するおそれがある。］[8.3, 9.1.2参照]
2.3 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

NOVARTIS　ノバルティス ファーマ株式会社

□□□□□□□□□□□□FMF/TRAPS/HIDS, MKD□□

□□□□□□□□□□Periodic Fever Syndrome□PFS□□□□□□□□FMF,TRAPS,HIDS□□□□□□□□□□□□□□□□□150mg□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□FMF/TRAPS/HIDS,MKD□□

□□□□□□□□□□□□□FMF/TRAPS/HIDS,MKD□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□

Image



クリオピリン関連周期性症候群
(cryopyrin-associated periodic syndrome : CAPS)治療における

イラリス® 皮下注射液150mgの使用指針

2023年4月版

ヒト型抗ヒトIL-1βモノクローナル抗体 高価基準収載

イラリス® 皮下注射液150mg カナキヌマブ(遺伝子組換え) 注射液

1. 警告
1.1 本剤投与により、敗血症を含む重篤な感染症等があらわれることがあり、本剤との関連性は明らかではないが、悪性腫瘍の発現も報告されている。本剤が疾病を完治させる薬剤でないことも含め、これらの情報を患者に十分説明し、患者が理解したことを確認した上で、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ本剤を投与すること。また、本剤の投与において、重篤な感染症等の副作用により、致命的な経過をたどることがあるので、緊急時に十分に措置できる医療施設及び医師のもとで投与し、本剤投与後に副作用が発現した場合には、速やかに担当医に連絡するよう患者に注意を与えること。[1.2, 2.1, 8.1, 8.2, 8.6, 9.1.1, 9.1.3, 9.1.4, 11.1.1参照]
1.2 敗血症等の致命的な感染症が報告されているため、十分な観察を行うなど感染症の発現に注意すること。[1.1, 2.1, 8.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.3, 9.1.4, 11.1.1参照]
1.3 本剤についての十分な知識と適応疾患の治療の知識・経験をもつ医師が使用すること。

2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)
2.1 重篤な感染症の患者[感染症が悪化するおそれがある。][1.1, 1.2, 8.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.3, 9.1.4, 11.1.1参照]
2.2 活動性結核の患者[症状が悪化するおそれがある。][8.3, 9.1.2参照]
2.3 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

NOVARTIS ノバルティス ファーマ株式会社

□□□□□□□□□□□□CAPS□□

□□□□□□□□□□□□□□□□CAPS□□□□□□□□□□□□□□□150mg□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□CAPS□□

□□□□□□□□□□□□□CAPS□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

Source URL: *https://www.pro.novartis.com/jp-ja/products/ilaris/shiyou*