

サーティカン錠を服用される方へ

注意：以下の場合には必ず主治医に相談してください

- 薬を服用して発疹などが出たことがある。
- ほかに薬を服用している。(薬局で買った薬も)
- 妊娠または授乳中である。

服用について

- **服用方法**：このお薬(錠剤)は、服用する直前にアルミシートから取り出してください。また、必ず指示に従い、コップ1杯の水またはぬるま湯といっしょに服用してください。
- **服用し忘れた場合**：気がついた時にできるだけ早く1回分を服用してください。ただし、次に服用する時間は5時間以上間隔をあけてください。
絶対に2回分をまとめて1度には服用しないでください。
- **併用での注意**：このお薬を服用しているときにグレープフルーツジュース※を飲むと、この薬の作用が強くなる可能性がありますので、避けてください。
※グレープフルーツには、この薬の作用を強める成分が含まれていますので、なるべく食べることは避けてください。
セイヨウオトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)を含む健康食品といっしょに服用すると、この薬の作用が弱くなる可能性がありますので、避けてください。
- **あやまって多く服用した場合**：すぐに主治医または薬剤師に相談してください。
- **高齢者の方へ**：特に指示を守って服用してください。
- **その他**：自分の判断で服用をやめないでください。

裏面も必ずご覧ください。

保管上の注意

- 服用直前まで、薬の包装のまま保存してください。
- 湿度の高い場所を避けて保存してください。
- 直射日光を避けて保存してください。
- 車の中や、室内の高温になる場所を避けて保存してください。
- シートをはさみなどで切って保存する場合は、ポケット部分を切らないように注意してください。
- 小児の手の届かない場所に保管してください。

主治医または薬局の連絡先

ノバルティス ファーマ株式会社

NOVARTIS DIRECT

0120-003-293

受付時間：月～金 9：00～17：30
(祝祭日及び当社休日を除く)

www.novartis.co.jp

CER00030GG0002

「CER患者さま向けしおり」

7417861GXXXXX