

ランプレンカプセル50mg

【この薬は？】

| | |
|-----------------|--|
| 販売名 | ランプレンカプセル50mg Lampren Capsules 50mg |
| 一般名 | クロファジミン Clofazimine |
| 含有量 (1カプセル中) | 50mg |

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、抗ハンセン病剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、ハンセン病の原因菌の増殖を抑え、ハンセン病の炎症反応を軽くし、症状を改善します。
- ・次の病気の人に処方されます。

〈適応症〉ハンセン病

〈適応菌種〉本剤に感性のらい菌

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にランプレンカプセルに含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人
- 次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
- ・頻回の下痢、腹痛などの胃腸障害のある人
 - ・高齢の人
 - ・抗結核薬イソニアジドを服用している人

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量と回数は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

〔ハンセン病（多菌型）の場合〕

1日1回1カプセル、または4～6カプセルを1週間に2～3回に分けて食直後に飲みます。

飲む期間は最低2年間です。

他の抗ハンセン病剤と併用されます。

〔ハンセン病（らい性結節性紅斑）の場合〕

| | 初期 | 維持期 |
|------|----------|---------|
| 一回量 | 2カプセル | 2カプセル |
| 飲む回数 | 1日1回、食直後 | 週3回、食直後 |

飲む期間は3ヵ月以内です。

●どのように飲むか？

食直後にコップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲むか、食事やミルク等と飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

・この薬を飲み始める前に治療について十分理解できるまで説明を受けてください。

- ・この薬は多くの量を長期間飲んだ場合は、まれに腸閉塞や脾臓梗塞（こうそく）をおこすことがあります。下痢や腹痛などの胃腸症状があらわれた場合は、医師に連絡してください。
- ・この薬の使用により皮膚及び毛髪が着色することがあります。この皮膚の着色は飲むのをやめてから着色が消えるまで数ヵ月から数年かかることがありますので、このことを十分に理解できるまで説明を受けてください。また、皮膚の着色は日光に当たると濃くなることがあります。
- ・この薬を使用中に視力が落ちたり、疲れやすくなったり、頭痛、めまいがおこった場合は、自動車の運転や機械の操作など危険を伴う作業は行わないでください。

い。

- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳を中止してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。


このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

| 重大な副作用 | 主な自覚症状 |
|----------------------|--|
| 腸閉塞 ちょうへいそく | 便やおならが出にくい、吐き気、嘔吐（おうと）、お腹が張る、腹痛 |
| 脾臓梗塞 ひぞうこうそく | 発熱、胸の痛み、息苦しい、動悸（どうき）、腹（左上腹部）の痛み |
| 血栓塞栓症 けっせんそくせんしょう | 吐き気、嘔吐（おうと）、脱力、まひ、激しい頭痛、胸の痛み、押しつぶされるような胸の痛み、突然の息切れ、激しい腹痛、お腹が張る、足の激しい痛み |

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

| 部位 | 自覚症状 |
|-----|---|
| 全身 | 発熱、脱力、まひ |
| 頭部 | 激しい頭痛 |
| 口や喉 | 吐き気、嘔吐（おうと） |
| 胸部 | 胸の痛み、息苦しい、動悸（どうき）、押しつぶされるような胸の痛み、突然の息切れ |
| 腹部 | お腹が張る、腹痛、腹（左上腹部）の痛み、激しい腹痛 |
| 手・足 | 足の激しい痛み |
| 便 | 便やおならが出にくい |

【この薬の形は？】

| 形状 | 球形の軟カプセル  |
|-------|---|
| 直径 | 7 mm |
| 重さ | 228 mg |
| 色 | 褐色 |
| 識別コード | なし |

【この薬に含まれているのは？】

| 有効成分 | クロファジミン |
|------|--|
| 添加物 | ナタネ油、ミツロウ、硬化油、大豆レシチン、ジブチルヒドロキシトルエン、無水クエン酸、プロピレングリコール カプセル本体にゼラチン、グリセリン、三二酸化鉄、黒酸化鉄、パラオキシ安息香酸エチルナトリウム、パラオキシ安息香酸プロピルナトリウム、香料、エチルバニリン |

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・この薬はチョコレート様の外観でバニラのおいがしますので、子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：ノバルティス ファーマ株式会社

(<https://www.novartis.co.jp>)

ノバルティスダイレクト

電話：0120-003-293

受付時間：月～金 9時～17時30分

（祝日及び当社休日を除く）