

クロザリル 市販後副作用の情報提供

2025 年 7 月更新版（2025 年 5 月末時点の情報を掲載）

市販後に認められた無顆粒球症

報告例数：220 例／220 件

発売開始以降、2025 年 5 月末時点までに無顆粒球症が 220 例に認められています。本剤との関連性が疑われる無顆粒球症報告例について以下に示します。

- 患者特定情報がない症例は除いています。
- 弊社安全性データベースより MedDRA（国際医学用語集の 1 つ）の基本語（PT）で集計しています。
- 調査中の報告など未確定な情報を含むため、今後追加情報を入手した場合は内容が変更になることがあります。

性別/年齢	発現時 投与量 (mg/日)	投与開始 から発現 までの期間	持続 期間	本剤の処置・治療	転帰	併発症状
女性/20 代	500	109 日	7 日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	なし
女性/60 代	300	44 日	15 日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	発熱
女性/40 代	300	55 日	11 日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	なし
男性/30 代	250	145 日	17 日	本剤中止, G-CSF	回復	なし
男性/20 代	400	121 日	8 日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	発熱
男性/30 代	400	74 日	8 日	発現前に中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	嘔吐, 下痢, 微熱
男性/40 代	400	49 日	7 日	本剤中止	回復	なし
女性/50 代	150	54 日	16 日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	尿路感染
男性/50 代	500	141 日	20 日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	発熱
男性/60 代	125	98 日	7 日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	なし
男性/40 代	450	84 日	21 日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	発熱
男性/40 代	50	75 日	5 日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	発熱
男性/60 代	350	90 日	25 日	本剤中止, 転院先で治療	回復	発熱
女性/50 代	200	52 日	31 日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	発熱
女性/20 代	300	256 日	2 日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	発熱
女性/40 代	150	49 日	11 日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	発熱
男性/60 代	350	112 日	12 日	本剤中止, G-CSF	回復	なし
男性/60 代	300	72 日	6 日	本剤中止, G-CSF	回復	なし
男性/60 代	600	295 日	4 日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	なし
女性/50 代	450	115 日	不明	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	軽快	発熱
男性/50 代	200	72 日	10 日	本剤中止	回復	なし
男性/60 代	350	71 日	15 日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	なし
男性/60 代	175	76 日	21 日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	発熱, 咽頭痛
男性/60 代	100	41 日	3 日	本剤中止	軽快	なし
男性/40 代	300	100 日	9 日	本剤中止, G-CSF, 専門病院転院	回復	発熱
女性/60 代	350	147 日	6 日	本剤中止, G-CSF	回復	なし
男性/30 代	400	127 日	不明	本剤中止, G-CSF	回復	悪性症候群(疑)
男性/40 代	300	83 日	14 日	本剤中止, G-CSF 投与	回復	白血球減少症
男性/60 代	200	62 日	10 日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	発熱
男性/40 代	500	135 日	82 日	本剤中止, G-CSF	回復	発熱, 浮腫
男性/40 代	400	72 日	6 日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	発熱, 咽頭痛
男性/40 代	300	69 日	15 日	本剤中止, G-CSF	回復	発熱, 白血球減少症

性別/年齢	発現時 投与量 (mg/日)	投与開始 から発現 までの期間	持続 期間	本剤の処置・治療	転帰	併発症状
男性/40代	275	150日	45日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	感冒症状
女性/70代	200	84日	14日	本剤中止, G-CSF	回復	白血球減少症
男性/40代	300	135日	不明	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	不明	白血球減少症
女性/60代	200	78日	14日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	発熱
女性/40代	不明	155日	66日	本剤中止	回復	白血球減少症
男性/70代	200	143日	12日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	発熱, 白血球減少症
女性/20代	600	224日	7日	本剤中止, 抗菌剤	回復	なし
男性/50代	400	67日	214日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	発熱
男性/40代	200	4ヵ月	10日	本剤中止, G-CSF	回復	なし
女性/50代	100	40日	22日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	なし
女性/50代	不明	10ヵ月	37日	本剤中止, G-CSF	回復	なし
男性/60代	175	59日	8日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	なし
女性/20代	275	150日	不明	本剤中止, 抗菌剤	軽快	発熱, 気管支肺炎
男性/20代	100	138日	31日	本剤中止, G-CSF	回復	なし
男性/50代	450	不明	不明	本剤中止, 治療不明	不明	不明
女性/40代	300	37日	10日	本剤中止, G-CSF	回復	発熱
男性/50代	600	136日	8日	本剤中止	回復	なし
女性/30代	300	121日	41日	本剤中止	回復	白血球減少症, 好中球減少症
男性/20代	600	526日	4日	本剤中止, G-CSF	回復	白血球数減少
男性/40代	不明	77日	29日	本剤中止	回復	なし
男性/50代	400	75日	42日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱性好中球減少
男性/40代	400	99日	20日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	白血球数減少
女性/40代	500	90日	10日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
男性/50代	200	50日	不明	本剤中止, G-CSF	回復	発熱, 好中球減少
男性/50代	225	不明	不明	本剤中止	不明	白血球減少症, 好中球減少症
男性/50代	225	103日	不明	本剤中止, 加熱食, G-CSF, 抗菌剤	回復	白血球減少, 好中球減少
女性/30代	100	3ヵ月	不明	本剤中止, 抗菌剤	回復	発熱
女性/40代	300	71日	12日	本剤中止, G-CSF	回復	なし
女性/50代	300	460日	6日	化学療法併用中に発現, 本剤中止, G-CSF	回復	白血球減少
女性/70代	150	55日	不明	本剤中止	回復	発熱
男性/30代	350	70日	不明	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	不明	発熱
男性/不明	100	不明	不明	本剤中止	不明	不明
女性/40代	300	160日	4日	本剤中止, G-CSF	回復	なし
男性/60代	500	不明	不明	本剤中止	回復	なし
男性/40代	300	51日	不明	本剤中止	不明	なし
女性/30代	500	85日	不明	本剤中止	未回復	なし
女性/40代	300	不明	不明	本剤中止	不明	不明
女性/20代	中止後 発現	103日	2日	本剤中止後に発現	回復	なし
男性/50代	500	不明	不明	本剤中止, G-CSF	回復	なし
男性/40代	350	57日	不明	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	軽快	なし
男性/60代	200	68日	10日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
男性/40代	350	60日	不明	本剤中止, G-CSF	軽快	なし
男性/40代	400	不明	不明	本剤中止	不明	なし
男性/40代	100	42日	13日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
男性/70代	300	85日	24日	本剤中止, G-CSF	回復	発熱
男性/50代	200	246日	7日	本剤中止, G-CSF	回復	発熱, 体調不良
女性/60代	600	85日	45日	本剤中止, G-CSF	回復	発熱
男性/40代	400	92日	不明	本剤中止, G-CSF	回復	発熱

性別/年齢	発現時 投与量 (mg/日)	投与開始 から発現 までの期間	持続 期間	本剤の処置・治療	転帰	併発症状
女性/50代	25	31日	不明	本剤中止	不明	不明
男性/40代	300	126日	3日	本剤中止, G-CSF	回復	不明
男性/40代	不明	不明	不明	本剤中止	不明	不明
男性/50代	300	不明	不明	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	不明	発熱
男性/50代	325	不明	不明	本剤中止	不明	不明
女性/40代	300	103日	29日	本剤中止	回復	不明
男性/30代	550	96日	不明	本剤中止	回復	不明
男性/30代	不明	72日	不明	本剤中止	回復	不明
女性/60代	不明	不明	不明	本剤中止	回復	不明
男性/60代	不明	不明	不明	本剤中止	回復	不明
男性/50代	450	4年6ヵ月	4日	本剤中止	回復	無
男性/40代	100	約3ヵ月	不明	本剤中止	回復	不明
男性/40代	325	126日	27日	本剤中止	回復	無
男性/60代	125	47日	不明	本剤中止	不明	不明
女性/30代	500	61日	不明	本剤中止	軽快	発熱
女性/40代	300	75日	10日	本剤中止	回復	不明
男性/50代	325	62日	25日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
男性/40代	200	不明	不明	本剤中止, G-CSF	不明	不明
女性/40代	200	49日	不明	本剤中止	回復	不明
女性/50代	175	67日	42日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
男性/40代	400	70日	13日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	無
女性/60代	100	43日	4日	本剤中止, G-CSF	回復	無
男性/50代	200	4年8ヵ月	4日	本剤中止	回復	発熱
男性/60代	75	64日	13日	本剤中止, G-CSF	回復	無
女性/50代	200	110日	29日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
女性/60代	100	63日	14日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	無
女性/40代	250	43日	5日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	無
男性/40代	250	204日	16日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	軽度倦怠感, 鼻汁
男性/30代	400	86日	14日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	軽度の発熱
男性/30代	300	6年7ヵ月	6日	本剤中止, G-CSF	回復	発熱
男性/40代	375	4年6ヵ月	34日	本剤中止	回復	不明
女性/20代	不明	80日	不明	本剤中止, G-CSF	回復	無
女性/60代	125	45日	14日	本剤中止, 抗菌剤	回復	発熱
女性/30代	600	1年5ヵ月	29日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	無
女性/50代	100	60日	12日	本剤中止, G-CSF	回復	無
男性/40代	150	3年5ヵ月	17日	本剤中止	回復	不明
男性/30代	500	142日	8日	本剤中止, G-CSF	回復	無
男性/40代	25	不明	不明	本剤中止	不明	不明
女性/70代	150	不明	不明	本剤中止	回復	不明
女性/40代	150	57日	不明	本剤中止	不明	不明
女性/60代	50	63日	15日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
男性/40代	350	不明	不明	本剤中止, G-CSF	軽快	発熱
男性/60代	150	30日	2日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
男性/50代	300	48日	15日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
男性/50代	100	51日	9日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	不明
男性/40代	200	68日	7日	本剤中止	回復	不明
男性/70代	300	4ヵ月	32日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	シュードモナス性菌血症（敗血症）, 発熱, 悪寒
女性/40代	225	71日	15日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	肺炎, 発熱

性別/年齢	発現時 投与量 (mg/日)	投与開始 から発現 までの期間	持続 期間	本剤の処置・治療	転帰	併発症状
男性/50代	200	1年4ヵ月	17日	本剤中止, G-CSF	不明	不明
男性/50代	250	8ヵ月	13日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	軽快	発熱, 気管支肺アスペルギルス症
男性/40代	600	5年5ヵ月	3日	本剤中止, G-CSF	回復	不明
男性/40代	300	83日	17日	本剤中止, G-CSF	回復	無
女性/30代	250	66日	3日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
女性/40代	200	37日	14日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
男性/50代	400	85日	不明	本剤中止	死亡	発熱, 意識障害, 敗血症
女性/40代	300	9ヵ月	17日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	蜂窩織炎性虫垂炎
女性/50代	300	49日	不明	本剤中止, G-CSF, 抗菌薬	軽快	発熱, 肝障害
女性/20代	400	4ヵ月	16日	本剤中止, G-CSF	回復	発熱
男性/40代	300	3ヵ月	18日	本剤中止, アデニン	回復	発熱
男性/50代	100	4ヵ月	不明	本剤中止	未報告	無
男性/50代	50	84日	17日	本剤中止, G-CSF	回復	不明
男性/30代	125	36日	4日	本剤中止, G-CSF	回復	不明
女性/60代	350	3ヵ月	14日	本剤中止, G-CSF, 抗菌薬	回復	発熱
男性/50代	250	不明	不明	本剤中止	未報告	不明
男性/30代	550	7ヵ月	11日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱, COVID-19
女性/50代	150	44日	10日	本剤中止	回復	無
男性/60代	175	2ヵ月	不明	本剤中止, G-CSF	回復	無
男性/40代	225	3年1ヵ月	不明	本剤中止	回復	不明
男性/50代	500	3ヵ月	不明	本剤中止, 抗菌剤	回復	発熱
男性/50代	125	3ヵ月	6日	本剤中止, G-CSF	回復	不明
男性/20代	350	3ヵ月	2日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	不明
女性/60代	25	46日	33日	本剤中止, G-CSF	回復	不明
男性/30代	125	30日	12日	本剤中止	回復	無
女性/20代	400	6ヵ月	15日	本剤中止, 抗菌剤	回復	無
女性/50代	200	36日	2日	本剤中止, G-CSF	回復	不明
男性/50代	100	53日	18日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	嚥下障害
男性/40代	375	2年11ヵ月	不明	本剤中止	不明	不明
男性/50代	300	45日	38日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
男性/40代	300	不明	不明	本剤中止	回復	不明
女性/50代	100	46日	不明	本剤中止, G-CSF	回復	不明
男性/40代	375	5ヵ月	20日	本剤中止	回復	無
女性/70代	75	56日	9日	本剤中止, G-CSF	回復	不明
男性/60代	250	67日	10日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱, 上咽頭炎, 倦怠感
男性/40代	300	不明	不明	本剤中止, G-CSF, アデニン	回復	不明
男性/40代	400	7ヵ月	不明	本剤中止, アデニン	未回復	発熱
男性/70代	400	50日	15日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
女性/70代	200	77日	11日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
男性/50代	300	48日	不明	本剤中止	未報告	発熱
男性/30代	400	70日	9日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
男性/60代	200	4ヵ月	30日	本剤中止, 抗菌剤	回復	肺炎
女性/60代	200	56日	19日	本剤中止, 抗菌剤	回復	発熱
男性/20代	50	3ヵ月	不明	本剤中止, アデニン, セファランチン	軽快	インフルエンザ
男性/60代	175	79日	不明	本剤中止	未報告	不明
男性/50代	150	74日	不明	本剤中止	未報告	不明
女性/50代	200	44日	不明	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	未回復	不明
男性/50代	175	3ヵ月	13日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	COVID-19, 発熱
女性/50代	150	53日	不明	本剤中止, G-CSF	回復	発熱

性別/年齢	発現時 投与量 (mg/日)	投与開始 から発現 までの期間	持続 期間	本剤の処置・治療	転帰	併発症状
男性/70 代	200	70 日	21 日	本剤中止	回復	無
男性/40 代	200	3 か月	不明	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
女性/40 代	175	9 か月	3 日	本剤中止	回復	無
女性/40 代	187.5	35 日	不明	本剤中止, 抗菌剤	回復	発熱
男性/50 代	400	不明	不明	本剤中止	未報告	不明
女性/50 代	125	44 日	不明	本剤中止, G-CSF	死亡	発熱
男性/50 代	100	42 日	15 日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
女性/50 代	150	40 日	20 日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
男性/30 代	300	64 日	不明	本剤中止	不明	発熱, 頭痛
男性/60 代	250	81 日	不明	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
女性/60 代	125	61 日	13 日	本剤中止	回復	発熱, 食欲減退
女性/50 代	200	6 か月	2 日	本剤中止	回復	無
男性/50 代	100	41 日	9 日	本剤中止, G-CSF	回復	無
女性/30 代	200	不明	不明	本剤中止	未報告	不明
女性/60 代	200	不明	不明	本剤中止	未回復	胆管炎, 肝機能異常
男性/20 代	200	58 日	不明	本剤中止, 抗生剤	回復	発熱
女性/30 代	225	3 年 11 か月	20 日	本剤中止, G-CSF	回復	不明
女性/50 代	400	41 日	不明	本剤中止	不明	無
女性/10 代	175	38 日	27 日	本剤中止, 抗生剤, G-CSF	回復	無
男性/40 代	400	69 日	7 日	本剤中止, G-CSF, 抗生剤, 抗真菌剤	回復	不明
女性/40 代	250	78 日	34 日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	無
女性/70 代	300	64 日	9 日	本剤中止, G-CSF, 抗生剤	回復	肺炎
男性/30 代	400	1 年	不明	本剤中止, G-CSF	未回復	不明
男性/40 代	600	不明	不明	本剤中止	未報告	不明
女性/60 代	100	5 か月	14 日	本剤中止, 抗生剤, アデニン	回復	発熱
女性/60 代	375	69 日	11 日	本剤中止, G-CSF, 抗生剤, 抗菌剤	回復	発熱
女性/60 代	200	2 か月	25 日	本剤中止, G-CSF, 抗生剤, 抗菌剤	回復	発熱, 倦怠感
女性/40 代	150	57 日	不明	本剤中止, 転院先で治療	回復	発熱
男性/50 代	175	不明	不明	本剤中止	回復	肺炎
女性/50 代	300	89 日	24 日	本剤中止	回復	不明
男性/60 代	100	61 日	不明	本剤中止	回復	インフルエンザ, 骨髄抑制
女性/30 代	200	4 か月	12 日	本剤中止, 抗生剤, 抗菌剤	回復	無
男性/40 代	475	不明	不明	本剤中止, G-CSF	未報告	敗血症, 感染, 機械的イレウス, 腹部感染, 播種性血管内凝固, 血管炎, 胃腸の炎症
女性/60 代	100	49 日	不明	本剤中止	回復	発熱
女性/50 代	325	40 日	不明	本剤中止	未回復	発熱
男性/40 代	150	40 日	9 日	本剤中止, G-CSF, 抗生剤	回復	発熱
男性/50 代	125	不明	不明	本剤中止	未報告	倦怠感
男性/30 代	12.5	30 日	13 日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	肺膿瘍
男性/50 代	425	6 か月	不明	本剤中止, G-CSF, アデニン, 抗生剤	未回復	発熱, CRP 増加
男性/40 代	300	65 日	不明	本剤中止	未報告	不明
女性/60 代	300	58 日	不明	本剤中止, G-CSF, 抗生剤, 抗菌剤	軽快	発熱, 食欲減退
男性/50 代	200	57 日	不明	本剤中止, 抗生剤	未回復	発熱
女性/50 代	300	不明	不明	本剤中止	未報告	不明

本剤添付文書の記載内容のほか、上記副作用と類似の副作用の発現にはご注意ください。

弊社製品の副作用に関するお問い合わせは、クロザリル・デジタルコミュニケーター（DC）またはノバルティスダイレクトにご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クロザリル・デジタルコミュニケーター（DC）

E-mail：clozaril.remote@novartis.com

電話番号：0800-222-8814（通話料無料）

業務時間：月～金 9:00～17:30（祝日及び当社休日を除く）

ノバルティスダイレクト

電話番号：0120-003-293（通話料無料）

受付時間：月～金 9:00～17:30（祝日及び弊社休日を除く）

ノバルティス ファーマ株式会社