

クロザリル 市販後副作用の情報提供

2025 年 7 月更新版（2025 年 5 月末時点の情報を掲載）

市販後に認められた心筋炎、心筋症

報告例数：153 例／154 件

発売開始以降、2025 年 5 月末時点までに心筋炎、心筋症が 153 例に認められています。本剤との関連性が疑われる心筋炎、心筋症報告例について以下に示します。

- 患者特定情報がない症例は除いています。
- 弊社安全性データベースより MedDRA（国際医学用語集の 1 つ）の基本語（PT）で集計しています。
- 調査中の報告など未確定な情報を含むため、今後追加情報を入手した場合は内容が変更になることがあります。

性別/年齢	報告された事象名	発現時 投与量 (mg/日)	投与開始 から発現 までの期間	持続 期間	本剤処置	転帰	初期症状
男性/20 代	心筋症(急性左心不全)	50	17 日	14 日	中止	回復	発熱
男性/40 代	拡張型心筋症	600	約 17 年	不明	中止	軽快	息切れ
女性/30 代	心拍量低下(心筋炎)	100	17 日	6 日	中止	回復	発熱
女性/40 代	薬剤性心筋障害	200	約 1 ヶ月半	約 2 ヶ月半	中止	軽快	発熱
男性/30 代	心筋炎疑い	100	15 日	6 日	中止	回復	発熱
女性/20 代	拡張型心筋症	200	約 1 ヶ月	約 2 ヶ月半	中止	軽快	頻脈, 心収縮低下, 心室期外収縮
女性/50 代	心筋炎疑い	75	21 日	32 日	中止	回復	発熱
男性/50 代	心筋障害	150	17 日	10 日	中止	回復	発熱
女性/30 代	心筋炎の可能性	150	20 日	不明	中止	不明	発熱
男性/50 代	心筋炎の疑い	不明	18 日	21	中止	回復	不明
女性/20 代	心筋炎の疑い	12.5	5 日	7 日	中止	回復	発熱, 咳嗽
男性/20 代	心膜心筋炎	125	15 日	66 日	中止	回復	発熱
女性/50 代	心筋症	不明	不明	不明	中止	不明	発熱
男性/40 代	心筋炎	200	21 日	18 日	中止	軽快	発熱
男性/20 代	心筋炎	200	不明	不明	中止	不明	発熱
男性/30 代	心筋炎	不明	不明	不明	中止	不明	不整脈, PVC 頻度上昇
男性/20 代	心筋炎	50	18 日	9 日	中止	軽快	発熱
男性/30 代	拡張型心筋症	75	10 日	10 日	中止	回復	発熱
男性/40 代	心筋炎の疑い	100	22 日	不明	中止	不明	不明
女性/50 代	心筋炎	150mg	23 日	不明	中止	回復	発熱
男性/50 代	心筋症	12.5	約 3 年半	約 1 ヶ月	休薬後 再開	回復	なし
男性/30 代	心筋炎疑い	不明	不明	不明	中止	不明	不明
男性/不明	心筋炎疑い	不明	不明	不明	中止	不明	不明
女性/20 代	薬剤性心筋炎の疑い	100	30 日	26 日	中止	回復	頻脈
女性/50 代	心筋炎疑い	37.5	18 日	46 日	中止	回復	発熱, 咽頭炎
女性/40 代	心筋炎疑い	125	13 日	13 日	中止	回復	発熱
女性/40 代	心筋炎疑い	150	不明	不明	中止	不明	不明
男性/40 代	心筋症疑い	不明	不明	不明	中止	回復	不明
男性/20 代	心膜心筋炎	175	19 日	14 日	中止	回復	発熱
男性/30 代	心筋炎	150	不明	不明	中止	回復	不明
男性/不明	薬剤性心筋障害(心膜心筋炎)	175	不明	不明	中止	回復	発熱

性別/年齢	報告された事象名	発現時 投与量 (mg/日)	投与開始 から発現 までの期間	持続 期間	本剤処置	転帰	初期症状
男性/40 代	心筋炎疑い	調査中	約 1 ヶ月	不明	継続	不明	発熱
女性/40 代	心筋炎	100	不明	不明	継続	不明	不明
男性/40 代	心筋炎	100	20 日	23 日	中止	軽快	感冒症状, 発熱
女性/30 代	心筋炎	150	19 日	11 日	中止	回復	不明
男性/40 代	心筋炎	不明	不明	不明	不明	不明	不明
女性/30 代	心筋症疑い	150	20 日	26 日	中止	回復	発熱
男性/40 代	心筋炎	250	不明	8 日	中止	回復	不明
男性/30 代	心筋炎	125	14 日	不明	中止	軽快	発熱
男性/40 代	心筋炎疑い	300	94 日	39 日	中止	回復	不明
男性/不明	心筋炎	100	不明	不明	不明	不明	発熱
男性/40 代	心筋炎疑い	不明	138 日	不明	中止	回復	不明
男性/30 代	薬剤性心筋炎の疑い	125	13 日	10 日	中止	回復	発熱
男性/20 代	心筋炎疑い	不明	29 日	不明	中止	不明	発熱
女性/50 代	クロザピン誘発性の心筋炎	150	25 日	19 日	中止	回復	不明
男性/50 代	クロザリル心筋炎	200	17 日	124 日	中止	軽快	発熱
男性/20 代	心筋炎	150	不明	不明	中止	回復	不明
男性/40 代	心筋炎疑い	75	20 日	1 日	中止	軽快	発熱
女性/50 代	心筋障害, 心筋炎	不明	不明	不明	中止	不明	不明
女性/20 代	心筋炎	不明	不明	不明	中止	軽快	頻脈
男性/20 代	心筋炎	150	24 日	不明	中止	回復	上気道炎症状(発熱, 倦怠感等)
男性/20 代	心筋炎の疑い	不明	不明	不明	中止	不明	発熱
女性/30 代	心筋障害の疑い	175	17 日	不明	中止	不明	発熱, 心電図異常 (ST 低下, T 波逆転)
女性/30 代	心筋炎(軽度)疑い	150	18 日	不明	中止	軽快	上咽頭炎, 発熱
男性/40 代	心筋炎	不明	10 日	12 日	中止	回復	気管支肺炎, 発熱
男性/20 代	心筋炎	150	14 日	不明	中止	軽快	不明
男性/50 代	心筋炎の疑い	不明	不明	不明	中止	不明	不明
男性/20 代	心筋炎の疑い	50	約 1 年 3 ヶ月	約 2 ヶ月	中止	回復	トロポニン T 増加
女性/40 代	心筋炎疑い	200mg	3~4 週	不明	不明	不明	発熱, トロポニン増加
男性/30 代	心筋疑い	125	不明	不明	中止	回復	発熱, 頻脈
男性/40 代	心筋炎疑い	100	16 日	18 日	中止	回復	発熱
男性/50 代	軽度心筋炎	不明	22 日	6 日	中止	回復	C-反応性蛋白増加, トロポニン I 増加
男性/40 代	心筋炎疑い	175	21 日	12 日	中止	回復	咳嗽, 倦怠感, 発熱, トロポニン T 増加, 心電図 ST 上昇
男性/70 代	心筋炎の疑い	不明	不明	不明	中止	不明	発熱, 頻脈
男性/20 代	心筋炎の疑い	150	18 日	12 日	中止	軽快	不明
女性/50 代	心筋炎	125	11 日	不明	中止	死亡	発熱, 呼吸困難
女性/40 代	心筋炎の疑い	不明	不明	不明	中止	軽快	発熱
男性/20 代	心筋炎疑い	不明 (25~30 だが 詳細不明)	19 日	11 日	中止	回復	発熱, 倦怠感, 胸部鈍痛, 動悸, 嘔気
男性/40 代	心筋炎	75	26 日	8 日	中止	軽快	発熱
男性/30 代	心筋炎疑い	不明	18 日	6 日	中止	回復	発熱
男性/30 代	心筋炎疑い	125	不明	不明	中止	不明	倦怠感, 白血球数増加, トロポニン T 増加
男性/40 代	心膜心筋炎	200	21 日	11 日	中止	回復	頭痛, 動悸, 微熱, 胸がチクチクする痛 み, 倦怠感, 軽度の息苦しさ
男性/40 代	心筋炎疑い	不明	17 日	5 日	中止	回復	発熱, 胸部不快感

性別/年齢	報告された事象名	発現時 投与量 (mg/日)	投与開始 から発現 までの期間	持続 期間	本剤処置	転帰	初期症状
男性/30代	心筋症疑い	不明	18日	不明	中止	未回復	不明
男性/40代	心筋炎	不明	27日	5日	中止	回復	発熱, 胸痛, 倦怠感, 食欲低下
女性/20代	心筋炎疑い	不明	不明	不明	中止	回復	不明
男性/20代	拡張型心筋症の疑い	不明	不明	不明	中止	未回復	不明
女性/50代	心筋炎	不明	24日	8日	中止	回復	息詰まり感, 発熱, 胸水貯留
男性/40代	心筋炎	不明	24日	不明	中止	軽快	発熱
男性/50代	心筋炎疑い	不明	6年4ヵ月	不明	中止	未回復	胸部不快感
女性/20代	心筋炎疑い	225	21日	不明	中止	不明	発熱
男性/40代	心筋炎	不明	18日	不明	中止	回復	不明
男性/30代	心筋炎疑い	100	23日	不明	中止	未報告	発熱, 全身倦怠感, 炎症反応
男性/10代	心筋炎	125	20日	5日	中止	回復	悪心, 発熱
男性/40代	心筋炎疑い	不明	不明	不明	中止	未報告	発熱, 誤嚥性肺炎
男性/50代	心筋炎疑い	不明	不明	不明	中止	未報告	不明
男性/40代	心筋炎疑い	125	23日	13日	中止	回復	流延過多, 誤嚥性肺炎
不明/不明	心筋炎	不明	不明	不明	不明	未報告	不明
男性/20代	心筋炎	不明	不明	不明	中止	軽快	不明
女性/40代	心筋炎	25	不明	不明	中止	未報告	不明
男性/40代	心筋炎疑い	不明	16日	10日	中止	回復	発熱, 肺炎
男性/40代	心筋炎	不明	19日	10日	中止	回復	心筋収縮性低下, 急性腎盂腎炎
不明/不明	心筋炎	不明	不明	不明	不明	未報告	発熱
不明/不明	心筋炎	不明	不明	不明	中止	未報告	発熱
男性/60代	心筋炎疑い	200	21日	不明	中止	未報告	不明
女性/50代	心筋炎	不明	22日	18日	中止	回復	不明
女性/50代	心筋炎疑い	100	不明	不明	中止	未報告	不明
男性/40代	心筋炎疑い	不明	不明	不明	中止	未報告	不明
男性/10代	クロザピン誘発性心筋炎	50	21日	5日	中止	回復	発熱, 倦怠感
男性/20代	心筋症	225	不明	不明	中止	回復	進行性の高血圧症
男性/50代	心筋炎疑い	不明	1年	38日	中止	回復	発熱
男性/60代	薬剤性心筋炎	75	24日	不明	中止	死亡	発熱
男性/40代	心筋炎疑い	100	不明	不明	中止	回復	発熱, CRP 上昇, トロポニン T 上昇
男性/30代	心筋炎の疑い	75	21日	不明	中止	軽快	発熱
男性/40代	心筋炎の疑い	不明	23日	19日	中止	回復	体調不良
男性/50代	心筋症	600	2年3ヵ月	不明	中止	未回復	不明
女性/50代	心筋炎の疑い	不明	22日	不明	中止	軽快	発熱
男性/20代	心筋炎疑い	不明	30日	不明	中止	軽快	発熱
女性/40代	心筋炎	125	23日	不明	中止	軽快	発熱, 浮腫
男性/40代	薬剤性心筋炎	75	12日	不明	中止	軽快	発熱
女性/50代	急性心筋炎	75	18日	26日	中止	回復	発熱, 酸素低下, 頻呼吸, 誤嚥性肺炎
男性/30代	心筋炎	75	21日	17日	中止	回復	心嚢液貯留, 洞性頻脈, 発熱, 心不全
男性/40代	薬剤性心筋炎の疑い	不明	15日	不明	中止	回復	発熱
男性/30代	クロザピン誘発性心筋炎	150	18日	19日	中止	回復したが後遺症あり	発熱, 誤嚥性肺炎, 胸水
女性/30代	心筋炎	不明	不明	不明	中止	未報告	発熱
男性/不明	心筋炎疑い	不明	不明	不明	不明	未報告	不明
女性/40代	心筋炎疑い	不明	不明	不明	中止	軽快	発熱
男性/60代	心筋炎疑い	不明	不明	不明	中止	回復	不明

性別/年齢	報告された事象名	発現時 投与量 (mg/日)	投与開始 から発現 までの期間	持続 期間	本剤処置	転帰	初期症状
女性/60 代	心筋炎の疑い	不明	14 日	不明	中止	未報告	胸痛, 発熱, 頻脈
男性/20 代	心筋炎疑い	不明	不明	不明	中止	未回復	発熱, 心不全傾向
男性/40 代	心筋炎疑い	不明	29 日	不明	減量	回復	トロポニン増加, CRP 上昇
男性/50 代	心筋炎疑い	50	不明	不明	中止	回復	駆出率 40%
男性/30 代	心筋炎の可能性	不明	不明	不明	中止	未報告	不明
不明/子供	心筋症の疑い	300	不明	不明	不明	不明	不明
不明/不明	軽度の心筋炎	不明	不明	不明	休薬	不明	不明
男性/40 代	心筋炎	50	22 日	22 日	休薬	回復	発熱
男性/70 代	心筋炎	50	約 1 ヶ月	不明	中止	軽快	トロポニン I 増加, 好酸球数増加
男性/60 代	心筋炎の疑い	不明	不明	不明	不明	未報告	不明
男性/50 代	心筋炎疑い	不明	不明	不明	中止	未報告	C-反応性蛋白増加, 発熱
女性/30 代	心筋炎の可能性が否定できない	不明	不明	不明	中止	未報告	ウイルス感染
女性/50 代	心筋炎	75	16 日	11 日	中止	回復	発熱
	心筋炎	不明	10 日程度	不明	中止	回復	発熱
女性/60 代	薬剤性心筋炎	75	16 日	7 日	中止	回復	発熱
男性/40 代	薬剤性心筋炎の疑い	100	不明 (投与初期)	不明	中止	未報告	発熱
男性/30 代	心筋炎	50	13 日	10 日	中止	回復	心嚢液貯留, 発熱, 倦怠感
男性/60 代	心筋炎の疑い	不明	16 日	8 日	中止	回復	発熱
男性/50 代	心筋炎疑い	125	22 日	9 日	中止	回復	発熱
女性/30 代	心筋炎 (薬剤性心筋炎)	50	16 日	27 日	中止	回復	気道の炎症, 発熱
男性/40 代	心筋炎	不明	18 日	11 日	中止	回復	発熱, 心嚢液貯留, 頻脈, 胸痛, 呼吸困難
男性/20 代	心筋炎の疑い/薬剤性心筋炎	不明	14 日	不明	中止	未報告	腸炎
女性/50 代	心筋炎疑い	不明	不明	不明	中止	不明	不明
男性/50 代	薬剤性心筋炎	不明	20 日	22 日	中止	回復	発熱, 炎症, 心筋収縮性低下
男性/50 代	心筋炎疑い	不明	16 日	4 日	休薬後 再開	回復	発熱, 倦怠感
女性/20 代	心筋炎	不明	不明	不明	不明	未報告	不明
男性/成人	心筋炎	不明	不明	不明	不明	未報告	不明
女性/30 代	心筋炎疑い	不明	22 日	不明	中止	未報告	発熱
男性/60 代	拡張型心筋症	不明	1 年 10 ヶ月	不明	中止	未回復	小脳梗塞, 心不全
男性/40 代	心筋炎	不明	10 日	4 日	中止	回復	C-反応性蛋白増加
女性/20 代	心筋炎疑い	不明	20 日	39 日	中止	回復	発熱
女性/50 代	薬剤性拡張型心筋症の疑い	不明	不明	不明	中止	軽快	不明
男性/20 代	一過性の心筋症	不明	不明	不明	中止	未報告	心不全, 心嚢液貯留
男性/40 代	心筋炎疑惑	不明	不明	不明	中止	未報告	発熱, トロポニン I 上昇
女性/40 代	心筋炎などの可能性	62.5	不明	不明	中止	未報告	C-反応性蛋白増加
男性/60 代	心筋炎疑い	不明	25 日	不明	中止	未報告	房室ブロック, 心電図 QT 延長, 誤嚥性肺炎, COVID-19

本剤添付文書の記載内容のほか、上記副作用と類似の副作用の発現にはご注意ください。

弊社製品の副作用に関するお問い合わせは、クロザリル・デジタルコミュニケーター（DC）またはノバルティスダイレクトにご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クロザリル・デジタルコミュニケーター（DC）

E-mail：clozaril.remote@novartis.com

電話番号：0800-222-8814（通話料無料）

業務時間：月～金 9:00～17:30（祝日及び当社休日を除く）

ノバルティスダイレクト

電話番号：0120-003-293（通話料無料）

受付時間：月～金 9:00～17:30（祝日及び弊社休日を除く）

ノバルティス ファーマ株式会社