

医薬品リスク管理計画
(RMP)

本資料は医薬品リスク管理計画に
基づき作成された資料です

ベオビュ®

硝子体内注射用キット120mg/mL

による治療を受ける患者さまへ

※このカードは携帯してください。

※目の違和感（中面に記載）を感じたら、
すぐに担当医に連絡してください。

NOVARTIS

表面

ベオビュの施術後、副作用が出る場合があります。

特に注意したい副作用

眼内炎、眼内炎症（ぶどう膜炎等）、網膜色素上皮裂孔、網膜剥離、網膜裂孔、網膜血管炎、網膜血管閉塞、眼圧上昇、硝子体出血

施術後に注意いただきたい主な症状

- 目のかすみ
- 視力の低下（を感じる）
- 目の痛みや不快感
- 目やに
- 眼充血の悪化
- まぶたや目の周囲の腫れ
- 黒い点が見える（飛蚊症）
- まぶしく感じる

ベオビュによる
治療ガイド（音声）は
こちらから



担当医の指示をよく守り、いつもと違う症状が
現れたら、すぐに担当医に連絡してください。

中面

通院している医療機関

医療機関名：

連絡先：

医師名：

投与日	20 年	20 年	20 年	20 年	20 年
	/	/	/	/	/

※診察時に先生にお渡しください。

BEO00001ZK0003

2025年11月作成

裏面