

クロザリル 市販後副作用の情報提供

2025年12月更新版（2025年11月末時点の情報を掲載）

市販後に認められた無顆粒球症

報告例数：233例／233件

発売開始以降、2025年11月末時点までに無顆粒球症が233例に認められています。本剤との関連性が疑われる無顆粒球症報告例について以下に示します。

- 患者特定情報がない症例は除いています。
- 弊社安全性データベースよりMedDRA（国際医学用語集の1つ）の基本語（PT）で集計しています。
- 調査中の報告など未確定な情報を含むため、今後追加情報を入手した場合は内容が変更になることがあります。

性別/年齢	発現時 投与量 (mg/日)	投与開始 から発現 までの期間	持続 期間	本剤の処置・治療	転帰	併発症状
女性/20代	500	109日	7日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	なし
女性/60代	300	44日	15日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	発熱
女性/40代	300	55日	11日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	なし
男性/30代	250	145日	17日	本剤中止, G-CSF	回復	なし
男性/20代	400	121日	8日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	発熱
男性/30代	400	74日	8日	発現前に中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	嘔吐, 下痢, 微熱
男性/40代	400	49日	7日	本剤中止	回復	なし
女性/50代	150	54日	16日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	尿路感染
男性/50代	500	141日	20日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	発熱
男性/60代	125	98日	7日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	なし
男性/40代	450	84日	21日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	発熱
男性/40代	50	75日	5日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	発熱
男性/60代	350	90日	25日	本剤中止, 転院先で治療	回復	発熱
女性/50代	200	52日	31日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	発熱
女性/20代	300	256日	2日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	発熱
女性/40代	150	49日	11日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	発熱
男性/60代	350	112日	12日	本剤中止, G-CSF	回復	なし
男性/60代	300	72日	6日	本剤中止, G-CSF	回復	なし
男性/60代	600	295日	4日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	なし
女性/50代	450	115日	不明	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	軽快	発熱
男性/50代	200	72日	10日	本剤中止	回復	なし
男性/60代	350	71日	15日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	なし
男性/60代	175	76日	21日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	発熱, 咽頭痛
男性/60代	100	41日	3日	本剤中止	軽快	なし
男性/40代	300	100日	9日	本剤中止, G-CSF, 専門病院転院	回復	発熱
女性/60代	350	147日	6日	本剤中止, G-CSF	回復	なし
男性/30代	400	127日	不明	本剤中止, G-CSF	回復	悪性症候群(疑)
男性/40代	300	83日	14日	本剤中止, G-CSF 投与	回復	白血球減少症
男性/60代	200	62日	10日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	発熱
男性/40代	500	135日	82日	本剤中止, G-CSF	回復	発熱, 浮腫
男性/40代	400	72日	6日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	発熱, 咽頭痛
男性/40代	300	69日	15日	本剤中止, G-CSF	回復	発熱, 白血球減少症

性別/年齢	発現時 投与量 (mg/日)	投与開始 から発現 までの期間	持続 期間	本剤の処置・治療	転帰	併発症状
男性/40代	275	150日	45日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	感冒症状
女性/70代	200	84日	14日	本剤中止, G-CSF	回復	白血球減少症
男性/40代	300	135日	不明	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	不明	白血球減少症
女性/60代	200	78日	14日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	発熱
女性/40代	不明	155日	66日	本剤中止	回復	白血球減少症
男性/70代	200	143日	12日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	発熱, 白血球減少症
女性/20代	600	224日	7日	本剤中止, 抗菌剤	回復	なし
男性/50代	400	67日	214日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	発熱
男性/40代	200	4ヶ月	10日	本剤中止, G-CSF	回復	なし
女性/50代	100	40日	22日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	なし
女性/50代	不明	10ヶ月	37日	本剤中止, G-CSF	回復	なし
男性/60代	175	59日	8日	本剤中止, 抗菌剤, G-CSF	回復	なし
女性/20代	275	150日	不明	本剤中止, 抗菌剤	軽快	発熱, 気管支肺炎
男性/20代	100	138日	31日	本剤中止, G-CSF	回復	なし
男性/50代	450	不明	不明	本剤中止, 治療不明	不明	不明
女性/40代	300	37日	10日	本剤中止, G-CSF	回復	発熱
男性/50代	600	136日	8日	本剤中止	回復	なし
女性/30代	300	121日	41日	本剤中止	回復	白血球減少症, 好中球減少症
男性/20代	600	526日	4日	本剤中止, G-CSF	回復	白血球数減少
男性/40代	不明	77日	29日	本剤中止	回復	なし
男性/50代	400	75日	42日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱性好中球減少
男性/40代	400	99日	20日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	白血球数減少
女性/40代	500	90日	10日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
男性/50代	200	50日	不明	本剤中止, G-CSF	回復	発熱, 好中球減少
男性/50代	225	不明	不明	本剤中止	不明	白血球減少症, 好中球減少症
男性/50代	225	103日	不明	本剤中止, 加熱食, G-CSF, 抗菌剤	回復	白血球減少, 好中球減少
女性/30代	100	77日	9日	本剤中止, 抗菌剤	回復	発熱, 誤嚥性肺炎
女性/40代	300	71日	12日	本剤中止, G-CSF	回復	なし
女性/50代	300	460日	6日	化学療法併用中に発現, 本剤中止, G-CSF	回復	白血球減少
女性/70代	150	55日	不明	本剤中止	回復	発熱
男性/30代	350	70日	不明	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	不明	発熱
男性/不明	100	不明	不明	本剤中止	不明	不明
女性/40代	300	160日	4日	本剤中止, G-CSF	回復	なし
男性/60代	500	不明	不明	本剤中止	回復	なし
男性/40代	300	51日	不明	本剤中止	不明	なし
女性/30代	500	85日	不明	本剤中止	未回復	なし
女性/40代	300	不明	不明	本剤中止	不明	不明
女性/20代	中止後 発現	103日	2日	本剤中止後に発現	回復	なし
男性/50代	500	不明	不明	本剤中止, G-CSF	回復	なし
男性/40代	350	57日	不明	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	軽快	なし
男性/60代	200	68日	10日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
男性/40代	350	60日	不明	本剤中止, G-CSF	軽快	なし
男性/40代	400	不明	不明	本剤中止	不明	なし
男性/40代	100	42日	13日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
男性/70代	300	85日	24日	本剤中止, G-CSF	回復	発熱
男性/50代	200	246日	7日	本剤中止, G-CSF	回復	発熱, 体調不良
女性/60代	600	85日	45日	本剤中止, G-CSF	回復	発熱
男性/40代	400	92日	不明	本剤中止, G-CSF	回復	発熱

性別/年齢	発現時 投与量 (mg/日)	投与開始 から発現 までの期間	持続 期間	本剤の処置・治療	転帰	併発症状
女性/50 代	25	31 日	不明	本剤中止	不明	不明
男性/40 代	300	126 日	3 日	本剤中止, G-CSF	回復	不明
男性/40 代	不明	不明	不明	本剤中止	不明	不明
男性/50 代	300	不明	不明	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	不明	発熱
男性/50 代	325	不明	不明	本剤中止	不明	不明
女性/40 代	300	103 日	29 日	本剤中止	回復	不明
男性/30 代	550	96 日	不明	本剤中止	回復	不明
男性/30 代	不明	72 日	不明	本剤中止	回復	不明
女性/60 代	不明	不明	不明	本剤中止	回復	不明
男性/60 代	不明	不明	不明	本剤中止	回復	不明
男性/50 代	450	4 年 6 カ月	4 日	本剤中止	回復	無
男性/40 代	100	約 3 カ月	不明	本剤中止	回復	不明
男性/40 代	325	126 日	27 日	本剤中止	回復	無
男性/60 代	125	47 日	不明	本剤中止	不明	不明
女性/30 代	500	61 日	不明	本剤中止	軽快	発熱
女性/40 代	300	75 日	10 日	本剤中止	回復	不明
男性/50 代	325	62 日	25 日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
男性/40 代	200	不明	不明	本剤中止, G-CSF	不明	不明
女性/40 代	200	49 日	不明	本剤中止	回復	不明
女性/50 代	175	67 日	42 日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
男性/40 代	400	70 日	13 日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	無
女性/60 代	100	43 日	4 日	本剤中止, G-CSF	回復	無
男性/50 代	200	4 年 8 カ月	4 日	本剤中止	回復	発熱
男性/60 代	75	64 日	13 日	本剤中止, G-CSF	回復	無
女性/50 代	200	110 日	29 日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
女性/60 代	100	63 日	14 日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	無
女性/40 代	250	43 日	5 日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	無
男性/40 代	250	204 日	16 日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	軽度倦怠感, 鼻汁
男性/30 代	400	86 日	14 日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	軽度の発熱
男性/30 代	300	6 年 7 カ月	6 日	本剤中止, G-CSF	回復	発熱
男性/40 代	375	4 年 6 カ月	34 日	本剤中止	回復	不明
女性/20 代	不明	80 日	不明	本剤中止, G-CSF	回復	無
女性/60 代	125	45 日	14 日	本剤中止, 抗菌剤	回復	発熱
女性/30 代	600	1 年 5 カ月	29 日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	無
女性/50 代	100	60 日	12 日	本剤中止, G-CSF	回復	無
男性/40 代	150	3 年 5 カ月	17 日	本剤中止	回復	不明
男性/30 代	500	142 日	8 日	本剤中止, G-CSF	回復	無
男性/40 代	25	不明	不明	本剤中止	不明	不明
女性/70 代	150	不明	不明	本剤中止	回復	不明
女性/40 代	150	57 日	不明	本剤中止	不明	不明
女性/60 代	50	63 日	15 日	本剤中止, G-CSF 抗菌剤	回復	発熱
男性/40 代	350	不明	不明	本剤中止, G-CSF	軽快	発熱
男性/60 代	150	30 日	2 日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
男性/50 代	300	48 日	15 日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
男性/50 代	100	51 日	9 日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	不明
男性/40 代	200	68 日	7 日	本剤中止	回復	不明
男性/70 代	300	4 カ月	32 日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	シュードモナス性菌血症（敗血症）, 発熱, 悪寒
女性/40 代	225	71 日	15 日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	肺炎, 発熱

性別/年齢	発現時 投与量 (mg/日)	投与開始 から発現 までの期間	持続 期間	本剤の処置・治療	転帰	併発症状
男性/50 代	200	1年 4ヵ月	17日	本剤中止, G-CSF	不明	不明
男性/50 代	250	8ヵ月	13日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	軽快	発熱, 気管支肺アスペルギルス症
男性/40 代	600	5年 5ヵ月	3日	本剤中止, G-CSF	回復	不明
男性/40 代	300	83日	17日	本剤中止, G-CSF	回復	無
女性/30 代	250	66日	3日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
女性/40 代	200	37日	14日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
男性/50 代	400	85日	不明	本剤中止	死亡	発熱, 意識障害, 敗血症
女性/40 代	300	9ヵ月	17日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	蜂窩織炎性虫垂炎
女性/50 代	300	49日	不明	本剤中止, G-CSF, 抗菌薬	軽快	発熱, 肝障害
女性/20 代	400	4ヵ月	16日	本剤中止, G-CSF	回復	発熱
男性/40 代	300	3ヵ月	18日	本剤中止, アデニン	回復	発熱
男性/50 代	100	4ヵ月	不明	本剤中止	未報告	無
男性/50 代	50	84日	17日	本剤中止, G-CSF	回復	不明
男性/30 代	125	36日	4日	本剤中止, G-CSF	回復	不明
女性/60 代	350	3ヵ月	14日	本剤中止, G-CSF, 抗菌薬	回復	発熱
男性/50 代	250	不明	不明	本剤中止	未報告	不明
男性/30 代	550	7ヵ月	11日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱, COVID-19
女性/50 代	150	44日	10日	本剤中止	回復	無
男性/60 代	175	2ヵ月	不明	本剤中止, G-CSF	回復	無
男性/40 代	225	3年 1ヵ月	不明	本剤中止	回復	不明
男性/50 代	500	3ヵ月	不明	本剤中止, 抗菌剤	回復	発熱
男性/50 代	125	3ヵ月	6日	本剤中止, G-CSF	回復	不明
男性/20 代	350	3ヵ月	2日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	不明
女性/60 代	25	46日	33日	本剤中止, G-CSF	回復	不明
男性/30 代	125	30日	12日	本剤中止	回復	無
女性/20 代	400	6ヵ月	15日	本剤中止, 抗菌剤	回復	無
女性/50 代	200	36日	2日	本剤中止, G-CSF	回復	不明
男性/50 代	100	53日	18日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	嚥下障害
男性/40 代	375	2年 11ヵ月	不明	本剤中止	不明	不明
男性/50 代	300	45日	38日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
男性/40 代	300	不明	不明	本剤中止	回復	不明
女性/50 代	100	46日	不明	本剤中止, G-CSF	回復	不明
男性/40 代	375	5ヵ月	20日	本剤中止	回復	無
女性/70 代	75	56日	9日	本剤中止, G-CSF	回復	不明
男性/60 代	250	67日	10日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱, 上咽頭炎, 倦怠感
男性/40 代	300	不明	不明	本剤中止, G-CSF, アデニン	回復	不明
男性/40 代	400	7ヵ月	不明	本剤中止, アデニン	未回復	発熱
男性/70 代	400	50日	15日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
女性/70 代	200	77日	11日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
男性/50 代	300	48日	不明	本剤中止	未報告	発熱
男性/30 代	400	70日	9日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
男性/60 代	200	4ヵ月	30日	本剤中止, 抗菌剤	回復	肺炎
女性/60 代	200	56日	19日	本剤中止, 抗菌剤	回復	発熱
男性/20 代	50	3ヵ月	不明	本剤中止, アデニン, セファランチン	軽快	インフルエンザ
男性/60 代	175	79日	不明	本剤中止	未報告	不明
男性/50 代	150	74日	不明	本剤中止	未報告	不明
女性/50 代	200	44日	不明	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	未回復	不明
男性/50 代	175	3ヵ月	13日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	COVID-19, 発熱
女性/50 代	150	53日	不明	本剤中止, G-CSF	回復	発熱

性別/年齢	発現時 投与量 (mg/日)	投与開始 から発現 までの期間	持続 期間	本剤の処置・治療	転帰	併発症状
男性/70 代	200	70 日	21 日	本剤中止	回復	無
男性/40 代	200	3 カ月	不明	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
女性/40 代	175	9 カ月	3 日	本剤中止	回復	無
女性/40 代	187.5	35 日	不明	本剤中止, 抗菌剤	回復	発熱
男性/50 代	400	不明	不明	本剤中止	未報告	不明
女性/50 代	125	44 日	14 日	本剤中止, G-CSF, 抗生剤, 抗真菌剤	死亡	発熱, ブドウ球菌性肺炎, ブドウ球菌性敗血症, 敗血症性ショック
男性/50 代	100	43 日	8 日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤, 抗生剤	回復	発熱
女性/50 代	150	40 日	20 日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
男性/30 代	300	64 日	不明	本剤中止	不明	発熱, 頭痛
男性/60 代	250	81 日	不明	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	発熱
女性/60 代	125	61 日	13 日	本剤中止	回復	発熱, 食欲減退
女性/50 代	200	6 カ月	2 日	本剤中止	回復	無
男性/50 代	100	41 日	9 日	本剤中止, G-CSF	回復	無
女性/30 代	200	90 日	6 日	本剤中止, G-CSF, 抗生剤	回復	発熱
女性/60 代	200	不明	不明	本剤中止	未回復	胆管炎, 肝機能異常
男性/20 代	200	58 日	9 日	本剤中止, G-CSF, 抗生剤	回復	発熱
女性/30 代	225	3 年 11 カ月	20 日	本剤中止, G-CSF, 抗生剤	回復	発熱
女性/50 代	400	41 日	不明	本剤中止	不明	無
女性/10 代	175	38 日	27 日	本剤中止, 抗生剤, G-CSF	回復	無
男性/40 代	400	69 日	7 日	本剤中止, G-CSF, 抗生剤, 抗真菌剤	回復	不明
女性/40 代	250	78 日	34 日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	無
女性/70 代	300	64 日	9 日	本剤中止, G-CSF, 抗生剤	回復	肺炎
男性/30 代	400	1 年	不明	本剤中止, G-CSF	未回復	不明
男性/40 代	600	不明	不明	本剤中止	未報告	不明
女性/60 代	100	5 カ月	14 日	本剤中止, 抗生剤, アデニン	回復	発熱
女性/60 代	375	69 日	11 日	本剤中止, G-CSF, 抗生剤, 抗菌剤	回復	発熱
女性/60 代	200	2 カ月	25 日	本剤中止, G-CSF, 抗生剤, 抗菌剤	回復	発熱, 倦怠感
女性/40 代	150	57 日	不明	本剤中止, 転院先で治療	回復	発熱
男性/50 代	175	不明	不明	本剤中止	回復	肺炎
女性/50 代	300	89 日	24 日	本剤中止	回復	不明
男性/60 代	100	61 日	不明	本剤中止	回復	インフルエンザ, 骨髄抑制
女性/30 代	200	4 カ月	12 日	本剤中止, 抗生剤, 抗菌剤	回復	無
男性/40 代	475	不明	不明	本剤中止, G-CSF	未報告	敗血症, 感染, 機械的イレウス, 腹部感染, 播種性血管内凝固, 血管炎, 胃腸の炎症
女性/60 代	100	49 日	不明	本剤中止	回復	発熱
女性/50 代	325	40 日	不明	本剤中止	未回復	発熱
男性/40 代	150	40 日	9 日	本剤中止, G-CSF, 抗生剤	回復	発熱
男性/50 代	125	不明	不明	本剤中止	未報告	倦怠感
男性/30 代	12.5	30 日	13 日	本剤中止, G-CSF, 抗菌剤	回復	肺膿瘍
男性/50 代	425	6 カ月	49 日	本剤中止, G-CSF, アデニン, 抗生剤	回復	発熱, CRP 増加
男性/40 代	300	65 日	不明	本剤中止	未報告	不明
女性/60 代	300	58 日	不明	本剤中止, G-CSF, 抗生剤, 抗菌剤	軽快	発熱, 食欲減退
男性/50 代	200	57 日	不明	本剤中止, 抗生剤	未回復	発熱
女性/50 代	300	68 日	12 日	本剤中止	回復	不明
男性/40 代	200	35 日	14 日	本剤中止	回復	発熱, 炎症
女性/50 代	500	63 日	不明	本剤中止, 抗菌剤	回復	発熱

性別/年齢	発現時 投与量 (mg/日)	投与開始 から発現 までの期間	持続 期間	本剤の処置・治療	転帰	併発症状
女性/40代	300	34日	不明	本剤中止, 抗生剤	未報告	不明
女性/50代	200	38日	不明	本剤中止	未報告	不明
女性/30代	250	8年8ヶ月	9日	本剤中止, 抗生剤, G-CSF	回復	発熱
女性/40代	250	54日	不明	本剤中止	回復	不明
女性/70代	175	57日	不明	本剤中止	回復	発熱
女性/60代	500	4ヶ月	不明	本剤中止, 抗生剤, G-CSF	未回復	発熱
女性/40代	200	56日	不明	本剤中止, G-CSF	未報告	発熱, 感染
女性/50代	200	75日	14日	本剤中止	回復	紅斑
男性/20代	600	不明	不明	本剤中止, G-CSF, 抗生剤	回復	発熱
男性/60代	200	4ヶ月	不明	本剤中止	未報告	不明
女性/50代	200	不明	不明	本剤中止	未報告	不明

本剤添付文書の記載内容のほか、上記副作用と類似の副作用の発現にはご留意ください。

弊社製品の副作用に関するお問い合わせは、クロザリル・デジタルコミュニケーションズ（DC）またはノバルティスダイレクトにご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クロザリル・デジタルコミュニケーションズ（DC）

E-mail : clozaryl.remote@novartis.com

電話番号：0800-222-8814（通話料無料）

業務時間：月～金 9:00～17:30（祝日及び当社休日を除く）

ノバルティスダイレクト

電話番号：0120-003-293（通話料無料）

受付時間：月～金 9:00～17:30（祝日及び弊社休日を除く）

ノバルティス フーマ株式会社