

De schaduwzijde van de zon
Image



Het stripboek 'De schaduwzijde van de zon' aanvragen

Voor dermatologen is het erg belangrijk om zich bewust te zijn van de psychologische impact van melanoom op patiënten. Angst komt zeer vaak voor en wordt vastgesteld bij bijna alle patiënten met melanoom. Het is een gevoel van bezorgdheid dat wordt veroorzaakt door een gebrek aan informatie over een dreiging of gevaar. Er is behoefte aan adequate sociale en familiale ondersteuning, maar ook aan psychologische hulp om beter met ziekte om te kunnen gaan. Het gebruiken van technieken om angst en stress te overwinnen zou helpen bij het beter functioneren van alle getroffen en ongeacht het stadium van de ziekte¹.

Stripboek aanvragen

Bent u zorgverlener? En wilt u dit stripverhaal voor uw patiënten aanvragen, vul dan het formulier in.

Image



Stripboek als hulpmiddel

Om te vermijden dat patiënten angstig worden na de diagnose van melanoom, hebben we een stripboek ontwikkeld dat dieper ingaat op wat het betekent om aan deze vorm van kanker te lijden, zowel lichamelijk als psychisch. Ook wordt ingehaakt op de verschillende stadia van deze aandoening, de onderzoeken en behandelingen die patiënten moeten ondergaan voor deze ziekte, maar ook de onzekerheid die dat met zich meebrengt. Met de informatie in het stripboek geeft u uw patiënten dus de mogelijkheid om zich beter voor te bereiden op hun ziekte en het benaderen van het verloop.

Achtergrond van het boek

Voor patiënten die (onlangs) gediagnosticeerd zijn met melanoom is dit stripboek ontwikkeld genaamd 'De schaduwzijde van de zon' door prof.dr. Caroline Robert, Institute Gustave Roussy, Villejuif, Frankrijk. De Nederlandse bewerking van het stripboek is gemaakt door prof. Dr. John B.A.G. Haanen, Internist-oncoloog en specialist in de behandeling van melanoom in het Antoni van Leeuwenhoek en als hoogleraar verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum.

Image



Behandelingproces melanoom

Naast het verstrekken van informatie vooraf, kan de behandelingsprocedure zelf ook helpen bij het verlichten van het angst gevoel voor de patiënt. Om te zorgen dat patiënten meer regie hebben over hun behandeling, kan er gekozen worden voor een orale thuisbehandeling. Dit heeft als gevolg dat de patiënt meedenkt over welke handelwijze het meest bij de eigen leefstijl past. Patiënten met een vorm van kanker hebben zelf daarnaast ook vaker een voorkeur voor orale behandeling, voornamelijk vanwege het gemak, de perceptie van werkzaamheid en ervaringen uit het verleden.²

Referenties:

1. Vojvodic A, Vlaskovic-Jovicevic T, Vojvodic P, Vojvodic J, Goldust M, Peric-Hajzler Z, Matovic D, Sijan G, Stepic N, Nguyen VT, Tirant M, Wollina U, Lotti T, Fioranelli M. Psychological Impact of Melanoma, How to Detect, Support and Help. Open Access Maced J Med Sci. 2019 Aug 30;7(18):3043-3045.
2. Eek D, Krohe M, Mazar I, Horsfield A, Pompilus F, Friebe R, Shields AL. Patient-reported preferences for oral versus intravenous administration for the treatment of cancer: a review of the literature. Patient Prefer Adherence. 2016 Aug 24;10:1609-21.

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/nl-nl/therapeutische-gebieden/oncologie/melanoom/de-schad>

uwzijde-van-de-zon-aanvragen