

При смене терапии с ингибиторов PCSK9 на инклизирин у некоторых пациентов наблюдается временное повышение уровня ХС ЛНП. Чем обусловлен этот эффект, влияет ли на долгосрочные результаты лечения, и стоит ли его опасаться?

Image



При смене терапии с ингибиторов PCSK9 на инклизирин у некоторых пациентов наблюдается временное повышение уровня ХС ЛНП. Чем обусловлен этот эффект, влияет ли на долгосрочные результаты лечения, и стоит ли его опасаться?

Ответ на этот вопрос — в новом видео: «Как меняется уровень ХС ЛНП при переключении с ингибиторов PCSK9 на инклизирин и почему это не должно вызывать беспокойства?». Расскажет доктор медицинских наук, профессор Напалков Дмитрий Александрович.

Почему при переключении с ингибиторов PCSK9 на инклисиран можно ожидать небольшого повышения уровня ХС ЛНП в первоначальном периоде? Будет ли это скорректировано в дальнейшей перспективе?

Напалков Дмитрий Александрович –

д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии № 1 Института клинической медицины имени Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова



Только для медицинских и фармацевтических работников. Для распространения на территории РФ в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях

VIDEO

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/ru-ru/therapeutic-areas/cardiology/Inclisiran-FAQ/pri-smene-terapii-s-ingibitorov-pcsk9-na-inklisiran-u-nekotoryh-pacientov-nablyudaetsya-vremennoe-povyshenie-urovnya-hs-lnp-chem-obuslovljen-etot-effekt-vliyaet-li-na-dolgosrochnye-rezultaty-lecheniya>