


Текущие подходы, их переосмысление и инновации в липидснижающей терапии



Текущие подходы, их переосмысление и инновации в липидснижающей терапии

Почему текущих подходов к липидснижающей терапии недостаточно?

Image



В реальной клинической практике лишь 20% пациентов очень высокого риска достигают целевого уровня ХС ЛНП

Image



Комбинированную терапию используют лишь 10% пациентов

Image



20% пациентов в Европе не принимают липидснижающую терапию вообще

Переосмысление подходов к терапии

Image



Быстрый старт

Ранняя инициация комбинированной липидснижающей терапии для эффективного снижения и дальнейшего удержания ХС ЛНП в рамках целевых значений.

Image



Снижение без промедления

Чем ниже и быстрее будут достигнуты целевые значения ХС ЛНП, закрепленные в клинических рекомендациях, тем лучше исходы и прогноз пациента.

Image



Риски низкой приверженности

Плохая комплаентность больных к лечению — это еще один фактор риска АССЗ.

Вперед к инновациям

Image



Достижение целевых значений ХС ЛНП

является залогом успеха в снижении рисков АССЗ. Расширение лекарственного арсенала молекулами с различным механизмом действия позволяет более эффективно достигать целевых уровней ХС ЛНП.

Image



Применение комбинации статина и эзетимиба зачастую недостаточно

Это подтверждают крайне низкие цифры достижения целевых значений ХС ЛНП у больных с высокой категорией сердечно-сосудистого риска.

Image



Решение

Современная инъекционная терапия для пациентов с недостижением целевых уровней ХС ЛНП (в силу недостаточной эффективности терапии или непереносимости статинов), больных с семейными формами гиперхолестеринемии, а также при выявлении высокого уровня ЛП(а).

В докладах на различных международных и российских конгрессах представляются разработки новых липидснижающих средств, в первую очередь РНК-терапии, мишенями для которых являются PCSK9 (МНН инклисиран), ANGPTL3, ангиопоэтинподобный белок 4 типа (ANGPTL4), апоСIII, липопротеин (а) (ЛП(а)).

Эксперты возлагают большие ожидания на эффективность применения новых терапевтических опций. В результате их применения происходит мощное снижение ХС ЛНП и/или триглицеридов, а значит, в третьей фазе клинических исследований при изучении клинических исходов в долгосрочном наблюдении можно ожидать снижения частоты развития сердечно-сосудистых событий.

Image

Ulrich Laufs

Agreement between Novartis and the NHS enables access to inclisiran

- NHS and Novartis collaboration...following the positive final recommendation from NICE...²
- Over three years **~300,000 patients at high risk** of a second cardiovascular event are expected to be treated with inclisiran...as a 6-monthly maintenance dose in the community setting.²
- **Nurses** ..to administer Inclisiran ...in GP surgeries across England
- Novartis will work with the NHS Accelerated Access Collaborative and the Academic Health Science Network (with the support of NHS Digital) to help them **proactively identify**, treat and monitor eligible individuals.....²
- The NHS is rolling out the injection **at unprecedented scale** because the health service and manufacturer have concluded a **deal that enables the NHS to utilise Inclisiran at an affordable and cost effective price**.¹

*Results courtesy of Novartis (data on file). Inclisiran is a PCSK9 inhibitor. PCSK9 is a protein that promotes the degradation of LDL receptors, which are responsible for removing LDL cholesterol from the blood. By inhibiting PCSK9, inclisiran increases the number of LDL receptors on the cell surface, leading to more efficient removal of LDL cholesterol from the blood.

1. NICE (National Institute for Health and Care Excellence) has recommended the use of inclisiran for the treatment of primary hypercholesterolemia. September 1, 2021. Accessed November 2021.

2. World first agreement between Novartis and the NHS enables broad and rapid access to first-in-class cholesterol lowering medicine. November 2021. Accessed November 2021.

90th EAS CONGRESS
MILAN May 22-25, 2022

Из доклада Ulrich Laufs «What is new in secondary prevention?» в рамках The 90th Congress of the European Atherosclerosis Society (EAS Congress 2022) 22-25 мая, 2022.

Актуальными аспектами липидснижающей терапии остаются следующие:

- **Достижение целевых значений ХС ЛНП** является залогом успеха в снижении рисков АССЗ. Расширение лекарственного арсенала молекулами с различным механизмом действия позволяет более эффективно достигать целевых уровней ХС ЛНП. Для пациентов очень высокого сердечно-сосудистого риска действует принцип «Чем ниже, тем лучше».
- **Вопрос о ранней инициации** комбинированной липидснижающей терапии для эффективного снижения и дальнейшего удержания ХС ЛНП в рамках целевых значений должен стать частью рутинной практики врача. Принцип «Чем

раньше, тем лучше».

- **Фокус липидснижающей терапии на удержании целевых значений ХС ЛНП** в качестве профилактики сердечно-сосудистых событий до наступления таковых должен стать ключевой целью терапии. Принцип «Чем дольше, тем лучше».

* По результатам работы The 90th Congress of the European Atherosclerosis Society (EAS Congress 2022) 22-25 мая, 2022.

11321341/INCL/DIG/11.24/0

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/ru-ru/therapeutic-areas/cardiology/atherosclerosis/experts-opinion/tekushchie-podhody-ih-pereosmyslenie-i-innovacii-v-lipidsnizhayushchey-terapii>