



Клинический случай №2

Опыт назначения инклизирана у пациента: длительное наблюдение

Приглашаем вас ознакомиться с клиническим случаем пациента Р., 60 лет, который перенес три инфаркта миокарда и имеет стабильную стенокардию напряжения III функционального класса. В анамнезе пациента такие сопутствующие заболевания, как артериальная гипертензия, фибрилляция предсердий, сахарный диабет 2 типа и стенозирующий атеросклероз.

Каких результатов можно достичь, назначая интенсивную липидснижающую терапию? Как инклизиран влияет на уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛНП)? Какие изменения наблюдаются в липидном профиле пациента после каждой инъекции инклизирана?

Эта презентация, подготовленная доктором Гармаевой О.В., заведующей кардиологическим отделением ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Улан-Удэ, предлагает ответы на эти и многие другие вопросы.

Не упустите возможность узнать больше о комплексном подходе к лечению пациентов с экстремальным сердечно-сосудистым риском и важности приверженности к назначенной терапии для достижения оптимальных результатов.





Previous slider-22141 Next slider-22141

11392126/SYB/DIG/0325/0

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/ru-ru/therapeutical-areas/cardiology/atherosclerosis/clinical-case-2>