


Диагностические критерии гнойного гидраденита

Image



Диагностические критерии гнойного гидраденита

Диагностика – важнейший этап для установления точного диагноза и, как следствие, выбора оптимальной терапии для пациентов с гнойным гидраденитом.

В этом коротком видео Хобейш Марианна Михайловна расскажет об особенностях диагностики и представит **диагностические критерии** гнойного гидраденита.

Image



Хобейш Марианна Михайловна

доцент кафедры дерматовенерологии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, руководитель центра терапии генноинженерными биологическими препаратами, к.м.н



Диагностические критерии установления диагноза

Основные критерии:

1. характерное поражение кожи (двойные открытые псевдокомедоны, узлы, абсцессы, свищевые ходы, рубцы);
2. склонность к локализации высыпаний в складках кожи в подмышечных областях, промежности и паховой области, в субмаммарной области и зонах молочных желез;
3. хроническое течение болезни, которое может быть персистирующим и рецидивирующим.

Дополнительные критерии, которые могут подтвердить диагноз ГГ:

1. семейный анамнез заболевания;
2. стерильное отделяемое свищевых ходов или наличие при бактериологическом исследовании комменсальной микрофлоры;
3. наличие эпителиального копчикового хода.



Проект. Клинические рекомендации РОДВК 2023. Гидраденит пилонный. <https://portalcr.miroslav.gov.ru/view/CB21451>

VIDEO

Длительность видео – 4 мин. 20 сек.

439748/SEC/DIG/05.25/0

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/ru-ru/therapeutic-areas/dermatology/gidradenty/korotkie-video/diagnosticheskie-kriterii-gnoynogo-gidradenita>