

Элтромбопаг. Дозирование и титрация для пациентов с ИТП

Image



Элтромбопаг. Дозирование и титрация для пациентов с ИТП

- Стартовая доза*
 - У взрослых и детей 6–17 лет — 50 мг/день
 - У детей 3–5 лет — 25 мг/день
- Титрация с шагом 25 мг до достижения целевого уровня тромбоцитов
- Максимальная суточная доза — 75 мг/день
- Коррекция дозы препарата элтромбопаг для пациентов с ИТП¹

Image

Количество тромбоцитов	Коррекция дозы или ответ
< 50000/мкл в течение по крайней мере 2 недель терапии	Увеличить суточную дозу на 25 мг до максимальной дозы 75 мг/сутки**.
≥ 50000/мкл ≤ 150000/мкл	Продолжить терапию препаратом в наименьшей суточной дозе и/или одновременную медикаментозную терапию ИТП для поддержания количества тромбоцитов, позволяющего предотвратить кровотечение или уменьшить его интенсивность.
150000/мкл ≤ 250000/мкл	Уменьшить суточную дозу на 25 мг. Через 2 недели оценить эффект от коррекции дозы и принять решение о дальнейшей коррекции дозы***.
250000/мкл	Отменить терапию препаратом; увеличить частоту определения количества тромбоцитов до 2 раз в неделю. При количестве тромбоцитов ≤ 100000/мкл возобновить терапию в суточной дозе, уменьшенной на 25 мг.

* У пациентов восточноазиатского происхождения — 25 мг/день.

** Для пациентов, получающих препарат в дозе 25 мг 1 раз через день, дозу увеличивают до 25 мг 1 раз в сутки.

*** Для пациентов, получающих препарат в дозе 25 мг 1 раз в сутки, следует рассмотреть возможность приема препарата в дозе 25 мг 1 раз через сутки.

Список литературы

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Элтромбопаг
https://www.novartis.ru/sites/www.novartis.ru/files/product-info/2020-11-03_Revolade_NPIv4_incl_v5_RU.pdf ® ЛСП-010032/09 на 19.03.2019.

11213633/REV/WEB/07.24/0

Source URL:

<https://www.pro.novartis.com/ru-ru/therapeutical-areas/hematology/eltrombopag-dozirovaniye-i-titratsiya-dlya-pacientov-s-itp>