

## Рекомендации по выбору дозировки руксолитиниба представлены в таблицах 1–3

**Таблица 1 —** Начальная доза руксолитиниба при лечении миелофиброза<sup>7</sup>

Тромбоциты	Доза руксолитиниба
$> 200 \times 10^9/\text{л}$	По 20 мг 2 раза в день
$100\text{--}200 \times 10^9/\text{л}$	По 15 мг 2 раза в день
$50\text{--}100 \times 10^9/\text{л}$	По 5 мг 2 раза в день

**Таблица 2 —** Выбор дозировки руксолитиниба при возобновлении терапии<sup>7</sup>

Количество тромбоцитов	Доза препарата при возобновлении терапии
$125 \times 10^9/\text{л}$ и более	20 мг 2 раза в день
100 — менее $125 \times 10^9/\text{л}$	15 мг 2 раза в день
75 — менее $100 \times 10^9/\text{л}$	10 мг 2 раза в день в течение 2 недель минимум; далее, при сохранении количества тромбоцитов, возможно увеличение до 15 мг 2 раза в день
50 — менее $75 \times 10^9/\text{л}$	5 мг 2 раза в день в течение 2 недель минимум; далее, при сохранении количества тромбоцитов, возможно увеличение до 10 мг 2 раза в день
Менее $50 \times 10^9/\text{л}$ и геморрагический синдром	Приостановление применения

**Таблица 3 —** Доза препарата руксолитиниб при снижении числа тромбоцитов<sup>7</sup>

Тромбоциты	Доза, применяемая до снижения количества тромбоцитов				
	25 мг 2 раза в день	20 мг 2 раза в день	15 мг 2 раза в день	10 мг 2 раза в день	5 мг 2 раза в день
Коррекция дозы					
100 — менее $125 \times 10^9/\text{л}$	20 мг 2 раза в день	15 мг 2 раза в день			Без изменений
75 — менее $100 \times 10^9/\text{л}$	10 мг 2 раза в день	10 мг 2 раза в день	10 мг 2 раза в день		Без изменений
50 — менее $75 \times 10^9/\text{л}$	5 мг 2 раза в день	5 мг 2 раза в день	5 мг 2 раза в день	5 мг 2 раза в день	Без изменений
Менее $50 \times 10^9/\text{л}$ и геморрагический синдром					Приостановление